

BIMËT
MJEKSORE & AROMATIKE
SHQIPTARE
*(Kërkesat Cilësore & Treguesit Fiziko-Kimik që
duhet të kenë)*

Tiranë, 2012

BIMËT
MJEKSORE & AROMATIKE
SHQIPTARE

(Kërkesat Cilësore & Treguesit Fiziko-Kimik që duhet të kenë)

Hartuar nga Shoqata Shqiptare e Bimeve Mjeksore & Aromatike (EPCA)

Me mbështetjen e Forumit Shqiptar Social Ekonomik – ASET dhe Financuar nga Fondacionit ABC

Redaktor dhe konsulent teknik: **Xhevit HYSENAJ**

Përgatiti fotot: **Orges LIPERI**

Ndihmuan: **Bordi i EPCA-s**

Redaktore letrare: **Albana IDËRSHAI**

©, EPCA 2011

Ky libër nuk është për shitje dhe duhet t'u dhurohet falas të gjithë Anëtarëve të EPCA-s

Tiranë, 2012

Parathënie

Të nderuar Kultivues, Vjelës, Grumbullues, Përpunues, Eksportues të bimëve mjeksore aromatike ku do që jeni në vendin tonë anëtar apo jo të Shoqatës Shqiptare të Bimëve Mjeksore dhe Aromatike (EPCA)!

Shoqata jonë me ndihmën e Forumit Shqiptar Social Ekonomik – ASET përmes financimit të Fondacionit ABC vendosi të dalë me këtë libër, në këtë kohë kur Eksportet e Bimëve Mjeksore Aromatike të Shqipërisë janë ulur në krahësim me vitet 1988 rreth 3 herë.

Në një kohë kur tregu botëror po i rrit kërkesat e cilësisë për produktet e kësaj industrie nga dita në ditë, në një kohë kur biznest në këtë industri vitet e fundit kanë rritur investimet për përpunimin e tyre dhe eksportin me një vlerë të shtuar, në një kohë kur produktet tona janë shumë të kërkuara në tregjet botërore, në një kohë kur cilësia e këtyre produkteve me ose pa qëllim në vendin tonë që nga Vermoshi deri në Sarandë është ulur ndjeshëm, por dhe në një kohë kur industria jonë po e ndien për ditë e më shumë ndihmën dhe vëmendjen e qeverisë për ta çuar përpara këtë industri, libri “Parametrat që duhet të arrihen në Bimët Mjeksore Aromatike” do të jetë në duart e të gjithëve si një udhërrëfyes për rritjen e cilësisë në të gjitha hallkat që nga vjelësi deri tek eksportuesi, për të ditur se cilat janë parametrat e bimëve mjeksore dhe aromatike për eksport dhe për përdorim të brendshëm.

Duke kuptuar se jashtë këtyre parametrave bima është e pavlefshme atëhere do jetë më e lehtë për të arritur këto parametra dhe për të rritur këtë industri duke e çuar atje ku e meriton.

Natyra e ka bërë të vetën me bujarinë e saj duke na dhuruar këtë pasuri të paçmuar për nga vlerat natyrore, ndaj duke ndjekur

parametrat e këtij libri ne arrijmë t'i japim jetë kësaj industrie. Duke zbatuar këto parametra do arrijmë të punojmë sot por dhe të mendojmë për brezat që do të vijnë.

Duke falenderuar veçanërisht Prof. Dr. Fatmir Memaj dhe Forumin Shqiptar Social Ekonomik - ASET, Fondacionin ABC dhe Bordin Drejtues të EPCA-s, ne po shpërndajmë këtë libër për t'i ardhur në ndihmë Industrisë së Bimëve Mjeksore dhe Aromatike të Shqipërisë për ta çuar atë më përpara në Standartet Evropiane dhe Amerikane si dy nga tregjet tona direkte dhe më të mëdhaja.

SUKSESE!

Xhevit HYSENAJ

Kryetari i Shoqatës Shqiptare të Bimëve Mjeksore dhe Aromatike

Përmbatja

Kategoria	Faqe
Lule	6-29
Fletë	30-62
Bar dhe herba	63-106
Kallinjë dhe kokra	107-125
Fruta	126-131
Farrëra	132-137
Lëvore	138-146
Bishta dhe sythe	147-148
Myshqe dhe mustaqe	149-154
Zhardhokë dhe rrënjë	155-169
Metodat e analizave kimike	170-183
Ambalazh	184-188
Pesticidet	189-196

BIME ETEROVAJORE Lule lavandule lulëzon në qershor - gusht	Flores Lavandulae Lavandula angustifolia MILL f. Labiatae
---	--

Kërkesat cilësore

Treguesit organo-shqisore

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Lule të çelura pjesërisht gonxhe që shkoqen nga lastaret, me pjesë të vetë bimës.
Era	Karakteristike e vetë bimës
Ngjyra	Lule me ngjyrë blu në vjollcë deri në të kaltërt të çelur me nuanca lehtësisht gri.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Lagështira, jo më shumë se	12
Lëndë organike të vetë bimës, jo më shumë se	5
Fijza me gjatësi nën 4 mm, e pjesë lastari të pa rrahura mirë, jo më shumë se	5
Lëndë organike të bimëve të tjera, jo më shumë se	1
Lëndë minerale, jo më shumë se	1

BIME MJEKESORE Lule akacie lulëzon	Flores Robiniae pseudacaciae Robina pseudacacia L.f Lugiminosae
--	--

Kerkesat cilësore

Treguesit organo-shqisorë

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Lule të çelura, të thata, të shkëputura nga veriga (veshuli), me bishtin e tyre natyral.
Ngjyra	E bardhë, e bardhë në krem të çelur. Nuk lejohen të kalbura, të nxira, të mykura, qime, pupla, insekte të gjalla e të ngordhura dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
1. Lagështira, jo më shumë se	12
2. Lule me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	10
3. Lëndë organike të bimës, jo më shumë se	0.5
4. Lëndë minerale, jo më shumë se	0.5

BIME MJEKESORE Lule aku lulëzon në qershor – shtator	Flores Helichrysi Helichrysum arenarium (L) De. F. compositae
---	--

Kërkesat cilësore

Treguesit organo-shqisore

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Lule të pastra, të thata, lule gjysëm të çelura, të prera nga ombrella në tufa të vogla, me bisht jo më të gjatë se 1 cm. Aroma e këndëshme e vetë bimës.
Ngjyra	Lule e verdhë në limoni, në qendër e verdhë në portokalli, bishti dhe kupa me push të bardhë në gri. Nuk lejohen të kalbura, të mykura, të nxira, insekte të gjalla e të ngordhura dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
1. Lagështira, jo më shumë se	10
2. Lule me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	3
3. Lule të zbërthyer, jo më shumë se	3
4. Lule me bisht të gjatë mbi 5 cm, jo më shumë se	3
5. Lëndë organike të vetë bimës ose të bimëve të tjera, jo më shumë se	1
6. Lëndë minerale, jo më shumë se	0.5

BIME MJEKESORE Lule agulice lulëzon prill qershor	Flores Primulae Primula veris L. f. primulaceae
---	--

Kerkesat cilësore*Treguesit organo-shqisorë*

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Lule të thata, të çelura, dhe pjesërisht lule në gonxhe në shpërthim. Lulet duhet të jenë të veçuara ose të bashkuara me bisht jo më të vogël se 3 cm.
Ngjyra	Lulet e verdha me kupe dhe bishti me ngjyrë jeshile. Nuk lejohen të kalbura, të mykura, të nxira, dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Lagështira, jo më shumë se	13
Lule me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	3
Lëndë organike të vetë bimës, jo më shumë se	1
Lëndë minerale, jo më shumë se	0.5

BIME MJEKESORE Lule Blini lulëzon në korrik - shtator	Flores Tiliae argentea Flores Tiliae officinalis
--	---

Kërkesat cilësore

Treguesit organo-shqisore

Treguesit	Karakteristikat	
	Argentea	Officinalis
Pamja	Lulja dhe braketa të thata, të plota, me bishtin e tyre natyral.	
		Pjesërisht të copëtuara. Gjethet në pjesën e sipërme dhe të poshtëme me push me ngjyrë të gjelbër në hiri, me damarë të kuq. Lulëzon dy javë më vonë se kultivaret e tjerë.
Aroma	Karakteristikë e vetë bimës	
Ngjyra	Lulja e verdhë dhe e verdhë deri në krem.	
	Braketa jeshile në të verdhë	Braketa jeshile, jeshile në të verdhë me damarë të kuq.

Shënim:

1. Lejohen lule të paçelura deri në 20% të luleve.
2. Shmangie nga ngjyra, lejohen jo më shumë se 8%.
3. Nuk lejohen të kalbura, të mykura, të nxira, qime, pupla e papastërti të tjera.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %	
	Argentea	Officinalis
Lagështira, jo më shumë se	13	13
Lule e braketa të copëtuara, që kalojnë në sitën me diametër të vrimës 3 mm, jo më shumë se	5	5
Lëndë organike të vetë bimës, jo më shumë se	1	1
Lule pa braketa dhe braketa pa lule, jo më shumë se	7	7
Lule të farëzuara ose krejtësisht gonxhe, jo më shumë se	10	10
Lëndë minerale, jo më shumë se	0.25	0.25

BIME MJEKESORE Lule çikore	Flores Cichorii Cichorium intybus L. F Compositae
--------------------------------------	--

Kërkesat cilësore

Treguesit organo-shqisore

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Lule me gonxhe dhe bishtin e tyre natyral, të thata. Aroma dhe shija karakteristike të vetë bimës.
Ngjyra	Lulet të kenë ngjyrë blu të hapët dhe lehtësisht në të verdhë, ndërsa kupa jeshile, jeshile në të hapët. Nuk lejohen të kalbura, të mykura, të nxira, dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Lagështira, jo më shumë se	13
Lule me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	3
Pjesë të ndryshme të vetë bimës dhe bimeve të tjera, jo më shumë se	1
Lëndë minerale në pluhur, jo më shumë se	0.5

BIME MJEKESORE Lule gjineshtër (lule xane) lulëzon në maj - gusht	Flores Spartii juncei Spartium junceum L.f Leguminosae
--	---

Kerkesat cilësore

Treguesit organo-shqisore

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Lule të çelura, të thata, se bashku me kupën me bishtin natyral të saj, të pastra, lulet pjesërisht të copëtuara, me madhësi të ndryshme, pa shije dalluese, me aromë të këndëshme karakteristike të vetë bimës, të pa farëzuara.
Ngjyra	E verdhë e çelur, e theksuar deri në të verdhë të thellë. Nuk lejohen të kalbura, të mykura, të nxira, insekte të gjalla ose të ngordhura dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Lagështira, jo më shumë se	12
Lulet me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	4
Lule të copëtuara që kalojnë në sitën me diametër 2 mm, jo më shumë se	4
Lule me kupa të paçelura dhe pjesë të tjera të vetë bimës, jo më shumë se	3
Lule të prekura nga insektet, jo më shumë se	0.5
Lëndë minerale, jo më shumë se	0.5

BIME MJEKESORE Lule zogu	Flores <i>Consolidae regalis</i> Flores <i>Calcatrippae</i> <i>Delphinium consolida</i> L.f <i>Ramunculaceae</i>
------------------------------------	---

Kërkesat cilësore

Treguesit organo-shqisore

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Lule, të thata, të këputura nga kërcelli, me bishtin e tyre natyral, të përziera me të dy varietetet <i>Regalis</i> dhe <i>Orientalis</i> .
Ngjyra	Blu dhe blu në rozë. Nuk lejohen të kalbura, të mykura, të nxira, insekte të gjalla ose të ngordhura dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Lagështira, jo më shumë se	10
Lulet me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	5
Gonxhe dhe lule të farëzuara, jo më shumë se	3
Lëndë organike të vetë bimës, jo më shumë se	1
Lëndë minerale, jo më shumë se	0.5

BIME MJEKËSORE Lule kulumbrie lulezon ne prill maj	Flores pruni spinosae Prunus spinosa L.f Rosaceae
---	--

Kërkesat cilësore*Treguesit organo-shqisorë*

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Lule të çelura, të plota, të thata, me bishtin e tyre natyral, lule të shkëputura nga buqeta. Pa aromë.
Ngjyra	Lule, petalet te bardha dhe të bardhë në krem në të verdhë. Kupa dhe bishti të gjelbër. Nuk lejohen të kalbura, të mykura, të nxira, insekte të gjalla ose të ngordhura dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Lagështira, jo më shumë se	12
Lulet me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	8
Lule me gonxhe, jo më shumë se	5
Lëndë organike të vetë bimës si fletë, bishta, buqeta etj, jo më shumë se	1.5
Lëndë organike të bimëve të tjera por jo helmuese, jo më shumë se	0.5
Lëndë minerale, jo më shumë se	0.25

BIME MJEKESORE Lule kamomili lulezon gjate veres	Flores chamomillae Matricaria chamomillae L.f Compositae
---	---

Kërkesat cilësore

Treguesit organo-shqisore

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Lule të thata, të plota, e me petale, me bishtin jo më të gjatë se 2.5 cm. Aroma e këndëshme e vetë bimës. Lulet të çelur, të zhvilluara por jo të pjekura tej masës (të farëzuara), rreth lules ndodhen petale të bardha.
Ngjyra	Natyrore, me petale të bardha, në qendër të verdhë. Nuk lejohen të kalbura, të mykura, të nxira, insekte të gjalla ose të ngordhura dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Lagështira, jo më shumë se	12
Lulet me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	2
Pluhur lulesh që kalon në sitën me diametër 2 mm, jo më shumë se	2
Lule me bisht jo më të gjatë se 2.5 cm, jo më shumë se	5

Lëndë të huaja të bimëve të tjera jo helmuese, jo me shumë se	0.5
Lule në formë gonxhe dhe pjesë të kupës, pa lule, jo më shumë se	1
Hi, jo më shumë se	12
Hi i patretshëm në acide, jo më shumë se	4
Përmbajtja në vajra esenciale, jo me pak se	0.4
Lëndë minerale, jo më shumë se	0.5
Pesticidet dhe ngarkesa Mikrobiale	Sipas normave të miratuara nga Ministria e Shëndetësisë

BIME MJEKESORE Petale të lulëkuqes lulezon ne mars prill	Flores rhoeados Papaver rhoeas L.f Papaveraceae
--	--

Kërkesat cilësore

Treguesit organo-shqisore

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Petale me ngjyre të zhvilluara, të thata, të plota, me njollaë të zezë në fund, petalet të shkrifëta dhe pjesërisht të ngjitura. Aroma karkarakteristike e vetë bimës.
Ngjyra	E kuqe dhe e kuqe në vishnjë. Nuk lejohen të kalbura, të mykura, të nxira, insekte të gjalla ose të ngordhura dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Lagështira, jo më shumë se	9
Petale me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	4
Lëndë organike të vetë bimës, jo më shumë se	0.5
Lëndë minerale, jo më shumë se	0.25

BIME MJEKESORE Lule shqerre (dele) lulezon ne mars korrik	Flores bellidis perennis Bellis perennis L.f Compositae
--	--

Kërkesat cilësore*Treguesit organo-shqisore*

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Lule të thata, të plota, me petale përrreth dhe me bisht jo me tepër se 2 cm. Pa aromë.
Ngjyra	Petalet të bardha me nuancë rozë, në qendër të verdhë. Nuk lejohen të kalbura, të mykura, të nxira, insekte të gjalla ose të ngordhura dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Lagështira, jo më shumë se	14
Lule me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	4
Lëndë organike të vetë bimës, jo më shumë se	1
Pluhur lulesh që kalojnë në sitën me diametër 2 mm, jo më shumë se	5
Lëndë minerale, jo më shumë se	0.5

<p>BIME MJEKESORE</p> <p>Lule murrizi me fletë lulezon ne maj qershor</p>	<p>Flores crataegi cum Folia Crataegus monogyna JACQ dhe Crataegus oxacantha L.f Rosaceae</p>
--	---

Kërkesat cilësore

Treguesit organo-shqisore

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Buqeta të lulëzuara, të thata, të sezonit me fletë e lule të plota dhe pjesërisht të rëna. Çdo buqetë duhet te përmbajë lule dhe pjesërisht gonxhe por jo fara me push bojë hiri ose pa push, me aromë karakteristike të vetë bimës.
Ngjyra	Lule e bardhë dhe e bardhë në rozë. Fletët, bishtat dhe kupa e gjelbër dhe e gjelbër në të hirtë. Nuk lejohen të kalbura, të mykura, të nxira, insekte të gjalla ose të ngordhura, degë të drunjëzuara dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Lagështira, jo më shumë se	13
Buqeta me lule me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	4
Lëndë organike të vetë bimës, jo më shumë se	1
Fletë të prekura nga insektet jo karantinore, jo më shumë se	3
Lëndë minerale, jo më shumë se	0.5

BIME MJEKËSORE Lule murrizi pa fletë	Flores Crataegi gerebelt Crataegus monoyna JACQ dhe crataegus oxycantha L.f. Rosaceae
---	--

Kërkesat cilësore

Treguesit organo-shqisorë

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Lule të thata, të pastra, të plota, me bishta jo më të gjatë se 1 cm, lulet të jenë pjesërisht me gonxhe pa formuar fara. Aroma dhe shija karakteristike të vetë bimës.
Ngjyra	Lulja e bardhë, e bardhë në krem dhe e bardhë lehtësisht në rozë, kupa dhe bishti të gjelbër me nuancë në gri dhe në të verdhë. Nuk lejohen të kalbura, të mykura, të nxira, insekte të gjalla ose të ngordhura dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Lagështira, jo më shumë se	12
Lulet me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	4
Lëndë organike të vetë bimës, jo më shumë se	3
Lëndë minerale, jo më shumë se	0.5

BIME MJEKESORE Lule manushaqe lulezon ne janar prill	Flores Violae odoratae Viola odorata l.f violaceae
---	---

Kërkesat cilësore

Treguesit organo-shqisorë

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Lule te zhvilluara, të çelura, me bisht jo më të gjatë se 3 cm, të thata. Aroma e këndëshme, karakteristike e vetë bimës.
Ngjyra	Lule me ngjyrë natyrale, kupa jeshile në violetë. Nuk lejohen të kalbura, të mykura, të nxira, insekte të gjalla ose të ngordhura dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Lagështira, jo më shumë se	11
Lule me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	1
Lëndë organike të vetë bimës, jo më shumë se	0.5
Lule minerale, jo më shumë se	0.5

BIME MJEKËSORE Lule mëllage lulezon ne janar prill	Flores malvae silvestr Malva silvestris L.f Malvaceae
--	--

Kërkesat cilësore*Treguesit organo-shqisore*

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Lule të çelura së bashku me kupën e tyre, me bisht jo më të gjatë se 2 cm, të thata. Aromë karakteristike të vetë bimës, me shije mulciloze.
Ngjyra	Lule me ngjyrë manushaqe e errët, manushaqe të çelur dhe kupa e gjelbër e çelur. Nuk lejohen të kalbura, të mykura, të nxira, insekte të gjalla ose të ngordhura dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Lagështira, jo më shumë se	14
Lule me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	6
Lëndë organike të vetë bimës, jo më shumë se	3
Lule që përmbajnë në kupë pjesërisht sëmundje (sucimia malvacearum), jo më shumë se	0.5
Lëndë minerale, jo më shumë se	0.5

BIME MJEKESORE Lule njëmijëfletëshe lulezon në maj - korrik	Flores Millefolii Achillea millefolium L.f Compositae
--	--

Kërkesat cilësore*Treguesit organo-shqisore*

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Lule të çelura, të lulëzuara, por jo të farëzuara, të thata, me petale përrreth lules me bisht jo më të gjatë se 2 cm. Aroma karakteristike e vetë bimës.
Ngjyra	Petalet të bardha dhe në qendër të verdhë të çelur. Nuk lejohen të kalbura, të mykura, të nxira, insekte të gjalla ose të ngordhura dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Lagështira, jo më shumë se	13
Lule me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	2
Lule me bisht 3-5 cm, jo më shumë se	10
Lule me gonxhe ose të farëzuara, jo më shumë se	5
Lule të varieteteve të tjera njëmijëfletëshe, jo më shumë se	0.2
Lëndë minerale, jo më shumë se	0.5

BIME MJEKËSORE Lule portokalli	Flores Aurantii Citrus sinensis L. OSBECK f. Rutaceae
--	--

Kërkesat cilësore*Treguesit organo-shqisore*

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Lule të thata, të plota dhe pjesërisht petalet të shkoqura nga kupa me bishtin e lules natyrale, me aromë të këndëshme karakteristike të vetë bimës, pa shije.
Ngjyra	Petalet e verdha, të verdha me nuanca në portokalle, kupa jeshile. Nuk lejohen të kalbura, të mykura, të nxira dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Lagështira, jo më shumë se	12
Lule me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	5
Kupa e lules pa petale dhe pa formuar frut të vogël, jo më shumë se	3
Lëndë minerale, jo më shumë se	0.5

BIME MJEKESORE Lule shtogu veshul lulezon ne prill - qershor	Flores Sambuci Sambucus nigra l.f Caprifoliaceae
--	---

Kërkesat cilësore

Treguesit organo-shqisore

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Lule të pashkoqura, nga ombrella, të thata, të plota dhe pjesërisht lule e kërcej të copëtuar.
Ngjyra	Lule të verdha natyrale, ndërsa kërcejt e ombrellës jeshile në të verdhë. Nuk lejohen të kalbura, të mykura, të nxira, insekte të gjalla ose të ngordhura dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Lagështira, jo më shumë se	12
Lulet me kërcej të humbura ngjyrën e tyre, jo më shumë se	8
Lëndë minerale, jo më shumë se	0.5

BIME MJEKËSORE Lule shtogu	Flores Sambuci gerebelt Sambucus nigra L.f Caprifoliaceae
--------------------------------------	--

Kërkesat cilësore*Treguesit organo-shqisore*

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Lule të çelura, të shkoqura prej ombrellës, pa bisht, me aromë specifike të vetë bimës.
Ngjyra	Lule e verdhë dhe e verdhë e çelur. Nuk lejohen të kalbura, të mykura, të nxira, dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Lagështira, jo më shumë se	10
Lulet me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	8
Lëndë të vetë bimës (bishta dhe kërcell lulesh të copëtuara por këto jo më të gjatë se 10 mm), jo më shumë se	4
Lëndë minerale, jo më shumë se	0.5

<p>BIME MJEKESORE</p> <p>Lule tërfil i kuq</p> <p>lulezon në maj - shtator</p>	<p>Flores Trifolii rubric</p> <p>Trifolium pretense L.f</p> <p>leguminosae</p>
--	---

Kërkesat cilësore

Treguesit organo-shqisore

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Lule të plota dhe pjesërisht të shkoqura, lulja të përmbajë kupën të shoqëruar me trifletë, me bisht jo më të gjatë se 1 cm, të çelura normalisht (të paferëzuara), të thata. Me aromë të lehtë karakteristike, pa shije.
Ngjyra	Natyrore, trendafili, me nuancë vjollcë dhe nuancë gri, në të verdhë. Nuk lejohen të kalbura, të mykura, të nxira, të farëzuara, me ngjyrë kafe, qime, lëndë të huaja, prania e insekteve etj.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Lagështira, jo më shumë se	13
Lule me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	3
Lule me bisht 1-3 cm, jo më shumë se	5
Pluhur lulësh që kalojnë në sitën me diametër 0.5 mm, jo më shumë se	1
Lule të llojeve të tërfileve të tjerë, jo më shumë se	3
Lëndë organike të vetë bimës dhe bimeve të tjera, jo më shumë se	0.5
Lëndë minerale, jo më shumë se	0.5

BIME MJEKESORE Lule thundërmushke lulezon ne shkurt - prill	Flores farfarae Tussilago farfara L.f Compositae
---	---

Kërkesat cilësore

Treguesit organo-shqisore

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Lule të plota së bashku me kupën, të çelura, gjysëm të çelura, me bishtin e vet me gjatësi jo më shumë se 1.5-2 cm, jo të farëzuara. Me aromë karakteristike të vetë bimës.
Ngjyra	Lulja e verdhë e hapur, kupa e gjelbër dhe e gjelbër në grixho. Nuk lejohen të kalbura, të mykura, të nxira, të pushëzuara, insekte të gjalla ose të ngordhura dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Lagështira, jo më shumë se	14
Lule me ngjyrë jo normale dhe gonxhe, jo më shumë se	4
Lule të zbërthyera (pushëzuara), jo më shumë se	5
Lëndë organike të vetë bimës jo më shumë se	1
Lëndë minerale, jo më shumë se	1

BIME ETEROVAJORE Fletë dafine	Folia lauri nobilis Laurus nobilis L. f Lauranceae
---	---

Kërkesat cilësore

Treguesit organo-shqisore

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Fletë të veçuara me përmasa të ndryshme, të plota e pjesërisht të thyera, me bishtin e tyre natyror, të thara. Erë e fortë aromatike dhe specifike e vetë bimës, shije djegëse, lehtësisht të hidhura dhe rrudhese.
Ngjyra	Faqja e sipërme me ngjyrë të gjelbërt e nditëshme, ndërsa faqja e poshteme e gjelbër e çelur me nuamnce të lehtë të verdhë, jo të nditshme. Nuk lejohen të nxira, të mykura, të kalbura, dëmtues dhe eskremente kafshësh.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Lagështira, jo më shumë se	12
Hiri i plotë, jo më shumë se	5
Vaj eterik, jo me pak se	1
Fletë me ngjyra jo normale, jo më shumë se	8
Fletë të coptuara që kalojnë në sitën me dimatër 5 mm, jo më shumë se	3
Lëndë organike të vetë bimës ose të bimëve të tjera jo helmuese, jo më shumë se	1
Fletë të prekura nga insektet jo karantionore në masën 10% të gjetthes, jo më shumë se	4
Lëndë minerale, jo më shumë se	0.5

BIME ETEROVAJORE Fletë rozmarine	Folia Rosmarini Rosmarinus officinalis L. F labiatae
--	---

Kërkesat cilësore*Treguesit organo-shqisore*

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Fletë të zhvilluara me madhësi të ndryshme, të thata, të plota dhe pjesërisht të thyera, me bishtin e tyre natyral, aroma e këndëshme specifike e vetë bimës.
Ngjyra	E gjelbër, e gjelbër në bojë hiri. Nuk lejohen fletë të nxira, të mykura, të verdha dhe papsterti të ndryshme si pjesë drusore të bimës etj.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Lagështira, jo më shumë se	13
Lëndë organike të vetë bimës si kërcëj dhe lule, jo më shumë se	1
Lëndë minerale, jo më shumë se	0.5
Fletë me ngjyrë jonormale, jo më shumë se	3
Fletë 5-6 në formë buqetashsh, jo më shumë se	2
Pjesë të coptuara që kalojnë në sitën me dimatër 3 mm, jo më shumë se	3
Esencë, jo me pak se	3

BIME TANIFERE Fletë shqeme dhe cermedell	Rhus cotinus L.f Anacardiaceae dhe Cotinus coggygia SCOP Sin Rhus Cotinus L.f. Anacardiaceae
--	---

Kërkesat cilësore

Treguesit organo-shqisorë

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Fletë të thata me bishtin natyral, të plota, të thyera, buqeta deri në 7 fletë në masën deri në 5%, trashësia e kërcejve jo më shumë se 2 mm. Aroma karakteristike e bimës, pa erë myku ose çfarëdo erë tjetër të huaj.
Ngjyra	Natyrale, jeshile e çelur dhe me nuanca të lehta, të kuqe. Nuk lejohen, të lagura, të mykura, të nxira, të kalbura dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Ekstartk i përgjithshëm, jo më shumë se	27
Lëndë tanine regjese, jo me pak se	14
Lëndë jo tanine, jo më shumë se	13
Lagështira, jo më shumë se	14
Lëndë të huaja, jo më shumë e	5

BIME MJEKËSORE Fletë arre	Folia iuglandis Iuglans regia L.f Juglandaceae
-------------------------------------	---

Kërkesat cilësore*Treguesit organo-shqisorë*

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Fletë të thata, të zhvilluara, të ndara nga bisqet, të plota dhe pjesërisht të thyera, të pa prekura nga insektet e sëmundjes të ndryshme. Me aromë dhe shije specifike të vetë bimës.
Ngjyra	E gjelbër e mbyllur dhe nga ana e pasme e gjelbër e çelur. Nuk lejohen të kalbura, të mykura, të nxira, dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Lagështira, jo më shumë se	13
Fletë me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	5
Fletë të copëtuara që kalojnë në sitën me diametër 3 mm, jo më shumë se	3
Fletë me pika ndryshku dhe të prekura nga insektet, jo më shumë se	5
Lëndë organike të vetë bimës ose të bimëve të tjera, jo helmuese, jo më shumë se	1
Lëndë minerale, jo më shumë se	0.5

BIME MJEKESORE Fletë bliri (oficinal)	Folia tiliae (officinalis) Tilia cordata MILL dhe Tilia platyphyllos SCOP f. Tiliaceae
---	---

Kërkesat cilësore*Treguesit organo-shqisore*

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Fletë të thata, të plota dhe pjesërisht të thyera, me bisht jo më të gjatë se 2 cm. aroma karakteristike e vetë bimës.
Ngjyra	Jeshile, jeshile e errët, jeshile të çelur pa pushezim. Nuk lejohen të kalbura, të mykura, të nxira, të verdha dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Lagështira, jo më shumë se	13
Fletë me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	5
Fletë të copëtuara që kalojnë në sitën me diametër 3 mm, jo më shumë se	3
Lëndë organike të vetë bimës ose të bimëve të tjera helmuese, jo më shumë se	1
Lëndë minerale, jo më shumë se	0.5

BIME MJEKESORE Fletë barblete	Folia melissae Melissa officinalis L.f Labiatae
---	--

Kërkesat cilësore*Treguesit organo-shqisore*

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Fletë të thata, të pastra, të zhvilluara, të plota dhe pjesërisht të thyera, me bishtin e tyre jo më të gjatë se 2 cm, fletë e dhëmbëzuar dhe e tejdukshme, pa push, aroma karakteristike e vetë bimës e ngjashme me atë të limonit.
Ngjyra	E gjelbër, e gjelbër e errët, me nuancë të lehta në të verdhë. Nuk lejohen të kalbura, të mykura, të nxira, insekte të gjalla ose të ngordhura dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Lagështira, jo më shumë se	13
Fletë me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	5
Fletë të copëtuara që kalojnë në sitën me diametër 3 mm, jo më shumë se	10
Lëndë organike të vetë bimës në formë majash (4-5 fletësh), jo më shumë se	5
Lëndë të bimëve të tjera jo helmuese, jo më shumë se	1
Lëndë minerale, jo më shumë se	0.5

BIME MJEKESORE Fletë (gjemba) dëllinjë te zezë	Folia juniper Communis Juniperus Communis L.f Cupressaceae
--	---

Kërkesat cilësore

Treguesit organo-shqisore

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Fletë të thata, të pastra, të plota, me dimensione të ndryshme, shpuese, pa aromë.
Ngjyra	E gjelbër, e gjelbër e çelur me nuancë të lehta të verdhë. Nuk lejohen të kalbura, të mykura, dhe papastërti të ndryshme si dhe gjemba të dëllinjës së kuqe.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Lagështira, jo më shumë se	12
Fletë me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	3
Lëndë organike të vetë bimës si copëza, degëza me gjatësi deri në 2 cm, jo më shumë se	2
Lëndë minerale, jo më shumë se	0.5

BIME MJEKËSORE Fletë eukalipti	Folia eucalypti Eucalyptus globules LABILL. F. Myrtaceae
--	---

Kërkesat cilësore

Treguesit organo-shqisorë

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Fletë të thata, me dimensione të ndryshme, të plota dhe pjesërisht të thyera, me bishtin e tyre natyral. Gjethë të gjata me majë, aromë e këndëshme e vetë bimës, ngjet pak si e ajo e limonit.
Ngjyra	E gjelbër, e gjelbër në të çelur. Nuk lejohen të kalbura, të mykura, të nxira, dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Lagështira, jo më shumë se	13
Fletë me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	3
Pjesë të fletë që kalojnë në sitën me diametër 3 mm, jo më shumë se	2
Lëndë organike të vetë bimës dhe të bimëve të tjera, jo më shumë se	2

BIME MJEKESORE Fletë manaferre	Folia rubi fruticosi Rubus fruticosus L. F. Rosaceae
--	---

Kërkesat cilësore

Treguesit organo-shqisore

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Fletë të zhvilluara, të plota dhe pjesërisht të copëtuara me bishtin e tyre natyral. Damari kryesor dhe bishti të përmbajë gjemba të vogla, pa erë dhe pa shije.
Ngjyra	E gjelbër, e gjelbër në të çelur, e dallueshme njera faqe me tjetrën. Nuk lejohen të kalbura, të mykura, të nxira, dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Lagështira, jo më shumë se	14
Fletë me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	3
Pjesë të fletës që kalojnë në sitën me dimensione 3 mm, jo më shumë se.	3
Fletë në formë buqetash, jo më shumë se	3
Lëndë organike të bimëve të tjera jo helmuese, jo më shumë se	1
Lëndë minerale, jo më shumë se	0.5

BIME MJEKESORE Fletë mjedhre	Folia Rubi idaei Rubus idaeus L. f. Rosaceae
--	---

Kërkesat cilësore*Treguesit organo-shqisore*

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Fletë të thata, të plota dhe pjesërisht të copëtuara me bishtin e tyre natyral. Fletët në anët e prapme janë të pushëzuara, pa aromë, dhe pa shije. Karakteristike janë dhëmbëzimet e theksuara anës gjethes e cila përfundon me majë.
Ngjyra	E gjelbër, e gjelbër e hapur me push grixho në të gjelbër. Nuk lejohen të kalbura, të mykura, të nxira, gjethe të thara nga vapa dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Lagështira, jo më shumë se	12
Fletë me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	3
Fletë të copëtuara që kalojnë në sitën me diametër 3 mm, jo më shumë se	3
Fletë në formë buqetash, jo më shumë se	3
Lëndë organike të bimëve të tjera, jo më shumë se	1
Lëndë minerale, jo më shumë se	0.5

BIME MJEKESORE Fletë ferre zvarranike	Folia Rubi caesili Rubus caesius L.f Rosaceae
---	--

Kërkesat cilësore

Treguesit organo-shqisore

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Fletë të thata, të plota dhe pjesërisht të thyera, me bishtin e tyre jo më të gjatë se 2 cm. Damari kryesor dhe bishti përmbajnë gjemba të vegjël të butë dhe jo shpues. Pa aromë e shije.
Ngjyra	Jeshile, jeshile në të errët me nuancë të lehta në të verdhë. Nuk lejohen të kalbura, të mykura, të nxira, të verdha dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Lagështira, jo më shumë se	14
Fletë me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	3
Fletë të copëtuara që kalojnë në sitën me diametër 3 mm, jo më shumë se	3
Fletë në formë buqetash, jo më shumë se	4
Lëndë organike të bimës, jo më shumë se	1
Lëndë minerale, jo më shumë se	1.5

BIMË MJEKËSORE Fletë frashëri i bardhë	Folia Fraxini Fraxinus ornus L.f. 01 eaceae
---	--

Kërkesat cilësore*Treguesit organo- shqisorë*

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Fletë të ndara nga vila, të zhvilluara, të thata, të plota dhe pjesërisht të thyera, me bishtin e tyre natyral, me aromë dhe shije të vetë bimës.
Ngjyra	E gjelbër, e gjelbër me nuancë të lehtë të verdha dhe në të errët. Nuk lejohen fletë të kalbura, të nxira, të mykura dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fiziko – kimik

Treguesit	Norma %
Lagështia, jo më shumë se	13
Fletë me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	3
Lëndë organike të vetë bimës ose të bimëve të tjera johelmuese, jo më shumë se	1
Lëndë minerale, jo më shumë se	0,5

BIMË MJEKËSORE Fletë gështenjë	Folia Castaneae vescae Castanea sativa MILL Sin. Castanea vesca GAERTN.f. Fagaceae
--	---

Kërkesat cilësore*Treguesit organo- shqisore*

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Fletë të zhvilluara, të thata, të plota dhe pjesërisht të thyera, me madhësi të ndryshme, me bishtin e tyre natyral, pa erë, anët të dhëmbëzuara dhe gjethe me majë.
Ngjyra	E gjelbër, e gjelbër në të çelur. Nuk lejohen fletë të nxira, të mykura, të kalbura, të ngrëna nga insektet dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fiziko – kimik

Treguesit	Norma %
Lagështia, jo më shumë se	12
Fletë me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	2
Fletë të coptuara, që kalojnë në sitën me diametër 3 mm, jo më shumë se	3
Lëndë organike të vetë bimës ose të bimëve të tjera, jo më shumë se	1
Buqeta me fletë (3-4 fletë), jo më shumë se	2
Lëndë minerale, jo më shumë se	0,5

BIMË MJEKËSORE Fletë delli e gjerë	Folia Plantaginis majoris Plantago major L.f. Plantaginaceae
--	---

Kërkesat cilësore*Treguesit organo- shqisore*

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Fletë të thata, të plota me madhësi të ndryshme me bisht jo më të gjatë se 3 cm, fletët pjesërisht mund të jenë të thyera ose të coptuara. Fletë e zhvilluar e gjerë me nervaturë të dalluar në mes për së gjati.
Ngjyra	Jeshile të çelur me damarë në të verdhë. Nuk lejohen fletë të nxira, të mykura, të kalbura, të prekura nga insektet dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fiziko – kimik

Treguesit	Norma %
Lagështia, jo më shumë se	14
Fletë me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	2
Fletë të coptuara, që kalojnë në sitën me diametër 3 mm, jo më shumë se	2
Lëndë organike të vetë bimës ose të bimëve të tjera, jo më shumë se	2
Lëndë minerale, jo më shumë se	1

BIMË MJEKËSORE Fletë delli e ngushtë	Folia Castaneae vescae Folia Plantaginis lanceolatae Plantago lanceolata L.f. Plantaginaceae
---	---

Kërkesat cilësore

Treguesit organo- shqisore

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Fletë të thata, të plota dhe pjesërisht të coptuara, me bishtin e tyre natyral, nga fundi duhet të jenë të prera, pa erë dhe me shije pak të hidhur. Fletët të paraqiten të gjata me nervaturë paralele.
Ngjyra	E gjelbër në errët dhe e gjelbër në të hirtë. Nuk lejohen fletë të nxira, të mykura, të kalbura, të ngrëna nga insektet dhe papastërti të ndryshme dhe gjethe të verdha e të pa pjekura siç janë të mezit të bimës.

Treguesit fiziko – kimik

Treguesit	Norma %
Lagështia, jo më shumë se	10
Fletë me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	4
Fletë të coptuara, që kalojnë në sitën me diametër 2 mm, jo më shumë se	3
Lëndë organike të vetë bimës ose të bimëve jo helmuese, jo më shumë se	1
Lëndë minerale, jo më shumë se	0,5

BIMË MJEKËSORE Fletë helmarine	Folia Belladonnae Atropa belladonna L.f. 01 Solanaceae
--	---

Kërkesat cilësore

Treguesit organo- shqisorë

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Fletë të zhvilluara, të thata, të plota dhe pjesërisht të thyera, me bishtin e tyre natyral, me aromë mbyhtëse, shije të hidhur dhe shumë helmonjëse.
Ngjyra	E gjelbër, e gjelbër e mbyllur, e gjelbër e çelur. Nuk lejohen fletë të kalbura, të nxira, të mykura dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fiziko – kimik

Treguesit	Norma %
Lagështia, jo më shumë se	13
Fletë me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	4
Fletë në formë buqetë me lule, jo më shumë se	10
Lëndë organike të vetë bimës ose të bimëve të tjera, jo më shumë se	1
Lëndë minerale, jo më shumë se	0,5

BIMË MJEKËSORE Fletë hithri	Folia Urticae Urtica dioica L.f. Urticaceae
---------------------------------------	--

Kërkesat cilësore

Treguesit organo- shqisore

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Fletë të thata, të plota, pjesërisht të coptuara, me aromë specifike të vetë bimës, anët e gjethit të dhëmbëzuara me qime të holla, me bishtin e tyre natyral.
Ngjyra	E gjelbër, e gjelbër në të errët. Nuk lejohen fletë të kalbura, të mykura, të nxira, fletë me ngjyrë kafe, kërcenj ose rrënjë të vetë bimës, etj., dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fiziko – kimik

Treguesit	Norma %
Lagështia, jo më shumë se	4
Fletë me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	5
Fletë të coptuara, që kalojnë në sitën me diametër 3 mm, jo më shumë se	10
Lëndë organike të vetë bimës, jo më shumë se	5
Lëndë organike të bimëve të tjera jo helmuese jo më shumë se	2
Lëndë minerale, jo më shumë se	1

BIMË MJEKËSORE Fletë lajthie	Folia Coryli Corylus avellana L.f. Corylaceae
---	--

Kërkesat cilësore*Treguesit organo- shqisorë*

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Fletë të thata, të plota dhe pjesërisht të coptuara, me bishtin e tyre natyral, pa erë dhe me shije pak të athët. Nga pamja paraqitet një rru dhje e cila mbulon pjesë pjesë gjethet.
Ngjyra	E gjelbër natyrale. Nuk lejohen fletë të kalbura, të mykura, të nxira dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fiziko – kimik

Treguesit	Norma %
Lagështia, jo më shumë se	12
Fletë me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	5
Lëndë organike të vetë bimës si degëza me ose pa fletë, jo më shumë se	1
Fletë të prekura nga insektet në 10% të fletës, jo më shumë se	5
Lëndë minerale, jo më shumë se	0,5

BIMË MJEKËSORE Fletë luleshtrydhe	Folia Fragariae Fragaria vesca L.f. Rosacea
--	--

Kërkesat cilësore

Treguesit organo- shqisore

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Fletë të thata, të plota dhe pjesërisht të thyera. Bishtin jo më të gjatë se 2 cm. Fletë të shkëputura dhe pjesërisht treshe. Pa aromë. Fletët në formë eliptike dhe të dhëmbëzuara për rreth. Nervatura të përkundrejta.
Ngjyra	E gjelbër, e gjelbër në gri, e mbuluar me një push të hollë. Nuk lejohen fletë të kalbura, të nxira, të mykura dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fiziko – kimik

Treguesit	Norma %
Lagështia, jo më shumë se	12
Fletë me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	4
Fletë me bishtin jo më të gjatë se 5 cm, jo më shumë se	5
Lëndë organike të bimëve jo helmuese, jo më shumë se	1
Lëndë minerale, jo më shumë se	0,5

BIMË MJEKËSORE Fletë manushaqe	Folia Violae odoratae Viola odorata L.f. Violaceae
---	---

Kërkesat cilësore*Treguesit organo- shqisorë*

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Fletë të thata, të plota, pjesërisht të thyera me bisht jo më të gjatë se 2 cm, të pa prekura nga insektet, pa aromë dhe pa shije.
Ngjyra	Jeshile, jeshile e errët dhe jeshile e çelët. Nuk lejohen fletë të nxira, të mykura, të verdha dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fiziko – kimik

Treguesit	Norma %
Lagështia, jo më shumë se	12
Fletë me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	3
Fletë të coptuara, që kalojnë në sitën me diametër 3 mm, jo më shumë se	3
Lëndë të huaja të vetë bimës ose të bimëve të tjera por jo helmuese, jo më shumë se	1
Lëndë minerale, jo më shumë se	0.5

BIMË MJEKËSORE Fletë mersine	Folia Myrti Myrtus communis L.f. Murtaceae
--	---

Kërkesat cilësore

Treguesit organo- shqisorë

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Fletë të thata, të pastra, të plota dhe pjesërisht të copëtuara, me bishtin e tyre natyral. Aroma dhe shija specifike e vetë bimës.
Ngjyra	E gjelbër, e gjelbër e çelur me nuancë të verdhë. Nuk lejohen fletë të kalbura, të mykura dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fiziko – kimik

Treguesit	Norma %
Lagështia, jo më shumë se	12
Fletë me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	2
Lëndë organike të vetë bimës, jo më shumë se	1
Fletë të prekura nga ndryshku (në bojë kafe), jo më shumë se	3
Lëndë minerale, jo më shumë se	0,5

BIMË MJEKËSORE Fletë mështekne	Folia Betulae Betula pendula ROTH.f. Betulaceae
---	--

Kërkesat cilësore*Treguesit organo- shqisorë*

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Fletë të thata, të zhvilluara me dimensione të ndryshme, të coptuara, me bishtin e saj natyral jo më të gjatë se 2 cm. Pa aromë, në pjesën e sipërme përfundon me majë.
Ngjyra	Në pjesën e sipërme e gjelbër, e gjelbër në gri, në pjesën e poshtëme me push të hollë gri. Nuk lejohen fletë të kalbura, të mykura, të nxira dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fiziko – kimik

Treguesit	Norma %
Lagështia, jo më shumë se	12
Fletë me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	4
Fletë të coptuara, që kalojnë në sitën me diametër 3 mm, jo më shumë se	8
Lëndë organike të vetë bimës dhe të bimëve të tjera jo helmuese, jo më shumë se	2
Lëndë minerale, jo më shumë se	1

BIMË MJEKËSORE Fletë mëllagë e bardhë	Folia Althaeae Althaea officinalis L.f. Malvaceae
--	--

Kërkesat cilësore*Treguesit organo- shqisore*

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Fletë të thata, të zhvilluara, të plota dhe pjesërisht të coptuara, bishti jo më i gjatë se 2,5 cm. Pa aromë, me push të butë gri e si kadife.
Ngjyra	Jeshile në gri, me nuancë të verdha në të lehtë, mbuluar me push të butë gri. Nuk lejohen fletë të kalbura, të mykura, të nxira dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fiziko – kimik

Treguesit	Norma %
Lagështia, jo më shumë se	12
Fletë me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	3
Pjesë të bimës si buqetë, lule, bishta me gjatësi mbi 2,5 cm, jo më shumë se	7
Pjesë të coptuara, që kalojnë në sitën me diametër 3 mm, jo më shumë se	2
Fletë të prekura nga insektet jo karantinore, jo më shumë se	1
Lëndë minerale, jo më shumë se	1

BIMË MJEKËSORE Fletë mëllage	Folia Malvae silvestris Malva silvestris L.f. Malvaceae
--	--

Kërkesat cilësore*Treguesit organo- shqisorë*

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Fletë të zhvilluara, të thata, të plota pjesërisht të coptuara, me bishtin e tyre natyral jo më të gjatë se 2 cm, pa erë, shije specifike e vetë bimës (mulciloze). Fleta pa njolla ndryshku ose sëmundje, të pabrejtura nga insektet.
Ngjyra	E gjelbër, e gjelbër e hapur. Nuk lejohen të mykura, të kalbura, të nxira dhe çdo papastërti tjetër.

Treguesit fiziko – kimik

Treguesit	Norma %
Lagështia, jo më shumë se	12
Fletë të coptuara, që kalojnë në sitën me diametër 3 mm, jo më shumë se	3
Fletë me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	5
Ekstrakti i lëngshëm, jo më shumë se	30
Lëndë organike të vetë bimës, jo më shumë se	1
Fletë të prekura nga kërpudha (Puccinia Malvacea-rum), jo më shumë se	3
Lëndë minerale në formë pluhuri, jo më shumë se	0.5

BIMË MJEKËSORE Fletë murrizi	Folia Crataegi Crataegus oxyacantha JACQ dhe Crataegus monogyna L.f. Rosaceae
---	--

Kërkesat cilësore

Treguesit organo- shqisore

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Fletë të zhvilluara, të thata, të plota pjesërisht të thyera, me bishtin e tyre natyral. Aroma dhe shija karakteristike e vetë bimës. Të pranueshëm janë të dy llojet.
Ngjyra	E gjelbër, e gjelbër me nuancë të lehta në të verdhë. Nuk lejohen të mykura, të kalbura, të nxira dhe çdo papastërti tjetër.

Treguesit fiziko – kimik

Treguesit	Norma %
Lagështia, jo më shumë se	12
Fletë të coptuara, që kalojnë në sitën me diametër 3 mm, jo më shumë se	3
Fletë me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	3
Fletë në formë buqete, jo më shumë se	1
Lëndë organike të vetë bimës, jo më shumë se	1
Lëndë minerale në formë pluhuri, jo më shumë se	0,5

BIMË MJEKËSORE Fletë netulle	Folia Verbasci Verbascum thapsiforme SCHRAD dhe Verbascum phlomoides L.F. Scrophulariaceae
--	---

Kërkesat cilësore*Treguesit organo- shqisore*

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Fletë të thata, të plota ose pjesërisht të coptuara, të zhvilluara, fletët të jenë të degëzimit dhe të trupit me bishtin e tyre natyral. Aroma dhe shija e vetë bimës.
Ngjyra	E gjelbër, e gjelbër në gri në të verdhë, e mbuluar lehtësisht me push. Nuk lejohen të mykura, të kalbura, të nxira dhe çdo papastërti tjetër.

Treguesit fiziko – kimik

Treguesit	Norma %
Lagështia, jo më shumë se	13
Fletë me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	3
Fletë të coptuara, që kalojnë në sitën me diametër 3 mm, jo më shumë se	3
Lëndë organike të vetë bimës dhe të bimëve të tjera, jo më shumë se	1
Lëndë minerale, jo më shumë se	0,5

BIMË MJEKËSORE Fletë qershigle	Folia Myrtilli Vaccinium myrtillus L.F. Ericaceae
--	--

Kërkesat cilësore

Treguesit organo- shqisore

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Fletë të zhvilluara ovale, të thata, të plota, e pjesërisht të thyera, me bishtin e tyre natyral, pa aromë dhe me shije pak të hidhur.
Ngjyra	E gjelbër e hapur deri në të gjelbër të mbyllur. Nuk lejohen të nxira, të mykura, të kalbura, gjethe bojë kafe, papastërti të ndryshme e kokrra të thata të vetë bimës.

Treguesit fiziko – kimik

Treguesit	Norma %
Lagështia, jo më shumë se	12
Fletë me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	4
Lëndë organike të vetë bimës si kërcenjtë, kokrat e thata, etj., jo më shumë se	2
Lëndë minerale, jo më shumë se	0,5

BIMË MJEKËSORE Fletë qumështore	Folia Taraxaci Taraxacum officinale WEB.f Compositae
---	---

Kërkesat cilësore*Treguesit organo- shqisorë*

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Fletë të thata, të plota dhe pjesërisht të thyera me bishtin e tyre natyral. Pa erë dhe me shije të hidhur.
Ngjyra	Jeshile, jeshile e hapur dhe jeshile e errët. Nuk lejohen fletë të verdha, të mykura, të kalbura, të nxira, të prekura nga insektet dhe çdo papastërti tjetër.

Treguesit fiziko – kimik

Treguesit	Norma %
Lagështia, jo më shumë se	10
Fletë me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	4
Fletë të coptuara, që kalojnë në sitën me diametër 3 mm, jo më shumë se	3
Lëndë organike të vetë bimës dhe të bimëve të tjera jo helmuese, jo më shumë se	1
Fletë të prekura nga insektet, jo më shumë se	1
Lëndë minerale, jo më shumë se	0,5

BIMË MJEKËSORE Fletë rrush ariu	Folia Uvae ursi Arctostaphylos uva-ursi (L) SPRENG f. Ericaceae
--	--

Kërkesat cilësore

Treguesit organo- shqisore

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Fletë të zhvilluara, të shkoqura nga kërcelli, të thata me dimensione të ndryshme dhe me bishtin e tyre natyral. Me me shije karakteristike të vetë bimës.
Ngjyra	Jeshile të ndritshme, jeshile me nuancë të lehta të verdhë. Nuk lejohen fletë të mykura, të kalbura, të nxira dhe çdo papastërti tjetër.

Treguesit fiziko – kimik

Treguesit	Norma %
Lagështia, jo më shumë se	13
Fletë me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	2
Lëndë organike të vetë bimës si dhe buqeta dhe degë të reja, jo më shumë se	2
Lëndë minerale, jo më shumë se	0.5

BIMË MJEKËSORE Fletë sherebele	Folia Salviae officinalis Salcia officinalis L.f Labiatae
--	--

Kërkesat cilësore*Treguesit organo- shqisore*

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Fletë të veçanta, të thata, të plota ose pjesërisht të thyera me bishtin e tyre natyral, të mbuluara me push në të dy anët. Aroma e këndshme dhe specifike e sherebelës, shija e hidhur dhe pak rrudhëse.
Ngjyra	Gjelbëroshe deri në gri argjendi. Nuk lejohen fletë të mykura, të kalbura, të nxira, bimë të helmëta, dëmtues dhe ekskremeente kafshësh.

Treguesit fiziko – kimik

Treguesit	Norma %
Lagështia, jo më shumë se	12
Fletë të coptuara, që kalojnë në sitën me diametër 3 mm, jo më shumë se	3
Buqeta me 2-3 fletë, jo më shumë se	8
Kërcej, pjesë të tjera të vetë bimës si dhe gjethe me ngjyrë (të verdhë, kafe) të ndryshme (jo normale), jo më shumë se	3
Lëndë nga bimë të tjera jo helmuese, jo më shumë se	0.5
Përmbajtja në vaj eterik, jo më pak se	1.5
Hiri i plotë, jo më shumë se	8
Lëndë minerale në formë pluhuri, jo më shumë se	0.5

BIMË MJEKËSORE Fletë thundërmushke	Folia Farfarae Tussilago farfara L.f. Compositae
--	---

Kërkesat cilësore

Treguesit organo- shqisore

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Fletë të thata, të plota dhe pjesërisht të coptuara, me bisht jo më të gjatë se 2 cm. Pa aromë dhe shije muciloze.
Ngjyra	Fletë në sipërfaqe të gjelbër në të çelur dhe nga poshtë me push në gri. Nuk lejohen fletë të nxira, të mykura, të kalbura, të verdha dhe të prekura kryesisht nga ndryshku, fletë me njolla ose të shpuara nga insektet dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fiziko – kimik

Treguesit	Norma %
Lagështia, jo më shumë se	13
Fletë me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	5
Fletë të prekura pjesërisht nga ndryshku në 1/10 e fletës, jo më shumë se	3
Lëndë organike të vetë bimës ose të bimëve të tjera, jo më shumë se	2
Fletë të coptuara, që kalojnë në sitën me diametër 4 mm, jo më shumë se	2
Lëndë minerale e huaj, jo më shumë se	2

BIMË MJEKËSORE Fletë ulliri	Folia Oleae Oleae eurapea L.f. 01 eaceae
--	---

Kërkesat cilësore*Treguesit organo- shqisore*

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Fletë të zhvilluara, të plota dhe pjesërisht të coptuara, të pastra e të thata, me bishtin e tyre natyral, pa erë dhe pa shije, në formë ovale e të pa dhëmbëzuara.
Ngjyra	Në faqen e brendëshme e gjelbër karakteristike e fletë ullirit në faqen e jashtme në bojë hiri. Nuk lejohen fletë të nxira, të mykura, të kalbura dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fiziko – kimik

Treguesit	Norma %
Lagështia, jo më shumë se	8
Fletë që kalojnë në sitën me diametër 3 mm, jo më shumë se	3
Buqeta të vogla 3 - 4 fletë të bashkuara, jo më shumë se	4
Fletë me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	3
Lëndë organike të vetë bimës, jo më shumë se	1
Lëndë minerale, jo më shumë se	0,5

BIMË MJEKËSORE Fletë vjeshulle	Folia Visci albi Viscum album L.f. Loranthaceae
---	--

Kërkesat cilësore

Treguesit organo- shqisore

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Fletë të thata, të plota dhe pjesërisht të thyera, me madhësi të ndryshme, me bishtin e tyre natyral, pa aromë dhe me shije pak të hidhur.
Ngjyra	Jeshile, jeshile me nuanca lehtësisht në të verdhë. Nuk lejohen fletë të nxira, të mykura, të kalbura dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fiziko – kimik

Treguesit	Norma %
Lagështia, jo më shumë se	13
Fletë me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	4
Lëndë organike të vetë bimës si bisqe të holla dhe buqeta 2-3 fletëshe, jo më shumë se	3
Lëndë minerale, jo më shumë se	0,5

BIME ETEROVAJORE Bar borzilok i njomë	Herba Basilisi recens Ocimum basilicum L. labiatae
---	---

Kërkesat cilësore*Treguesit organo-shqisore*

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Herba të njoma të pastërta, me gjatësi 20-40 cm, kërcelli i mbuluar me fletë e lule të çelura në masën 50-70 % dhe pjesa tjetër gonxhe. Herba korrekt 15-20 cm mbi sipërfaqen e tokës, pa fleta të verdha e rrënjë, pa përzierje të tjera bimore, degët të jenë të pasura me gjethe pa drunjezauara.
Ngjyra	Gjethet dhe kërcelli të gjelbërta, të gjelbëra të çelura, lulja rozë, rozë në manushaqe. Nuk lejohen herba të nxira, të mykura, të kalbura dhe papsterti të ndryshme.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Lëndë organike të bimëve të tjera jo helmuese, jo më shumë se	1
Lëndë organike të vetë bimës (kërcej pa fletë dhe të drunjezuar), jo më shumë se	2
Lëndë minerale, jo më shumë se	1
Herba me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	5

BIME ETEROVAJORE Bar borzilok i thatë	Herba Basilisi recens Ocimum basilicum L. labiatae
---	---

Kërkesat cilësore*Treguesit organo-shqisorë*

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Herba të thata të mbushura me fletë e lule të pastra të zhvilluara të plota, dhe pjesërisht fletë dhe lule të shkoqura, kërcelli kryesor i herbes mund të ketë farëra kurse degët e tjera jo. Degët anësore dhe degëzat me lule e gonxhe të parëzuara. Gjatësia e herbes 15-40 cm. Aroma dhe shija karakteristike e vetë bimës.
Ngjyra	Fletë të gjelbëra dhe të gjelbra të çelura, kërcelli i gjelbër dhe në gri dhe e gjelbër në manushaqe të verdhë. Lulet rozë, rozë në manushaqe në të bardhë. Nuk lejohen të mykura, të kalbura, të nxira, të verdha e papastërti të ndryshme.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Lëndë organike të vetë bimës dhe bimëve të tjera por jo vajore dhe jo helmuese, jo më shumë se	2
Lagështira, jo më shumë se	12
Lëndë minerale, jo më shumë se	1
Herba me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	4

BIME ETEROVAJORE Borzilok i shkoqur	Herba Basilisi gerebelt Ocimum basilicum L. labiatae
---	---

Kërkesat cilësore*Treguesit organo-shqisore*

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Fletët dhe lulet të shkoqura nga kërcelli, kalohen në sitën me diametr 4 mm, të pastrohen nga bishtat e dëmtuara, lëndët e huaja dhe të risitet në sitën me dimatër 0.5 mm, për heqjen e pluhurit. Aroma dhe shija karakteristike të vetë bimës.
Ngjyra	Ngjyra e lules rozë e bardhë në krem dhe e fletëve e gjelbër e çelur ose e gjelbër me nuancë të verdha. Nuk lejohen fletë e lule të kalbura, të mykura, të nxira, dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Lagështira, jo më shumë se	12
Lëndë organike të vetë bimës me gjatësi 2 cm, jo më shumë se	2
Lëndë minerale, jo më shumë se	0.5
Pjesë me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	2
Farërat e papjekura në bojë kafe, jo më shumë se	1
Përmbajtja në hi, jo më shumë se	12

BIME ETEROVAJORE Mendër e butë e njomë	Herba menthae piperitae recens Menthe piperita L. f Labitae
---	--

Kërkesat cilësore

Treguesit organo-shqisore

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Herba të korret kur bima ka arritur 50-70 % të lulëzimit, herba e njomë, të pastërta, duke mbajtur në kërcell fletë dhe lule, pa rrënjë dhe pa barërat e tjera të këqia. Korrja e herbës bëhet në orët 10 ⁰⁰ -16 ⁰⁰ . Aroma e fortë specifike e vetë bimës.
Ngjyra	Lule rozë, fletët të gjelbëra, të gjelbër të errët, damari me kërcellin manushaqe. Nuk lejohen të nxira, të mykura, të verdha, të fermentuara (nxehura) dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Herba me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	5
Lëndë organike të vetë bimës, jo më shumë se	2
Lëndë organike të llojeve të tjera të menteve si menta Rubia, jo më shumë se	0.5
Lëndë minerale, jo më shumë se	1.5

BIME ETEROVAJORE Mendër e butë e thatë	Herba menthae piperitae Menthe piperita L. f Labitae
--	---

Kërkesat cilësore*Treguesit organo-shqisurë*

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Herba e thatë, e pastër e lulëzuar në masën 50-70% e mbushur me fletë (pjesërisht të thyera) pa rrënjë dhe pa pjesë të verdha, të pastra nga barërat e tjera. Aroma e fortë karakteristike e vetë bimës.
Ngjyra	Lule rozë, fletët të gjelbera, të gjelbëra në të errët. Kërçelli (trupi) dhe damari i fletëve manushaqe. Nuk lejohen të nxira, të mykur, të kalbura dhe dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Lagështira, jo më shumë se	13
Lëndë organike të vetë bimës, jo më shumë se	2
Herba me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	4
Menta të llojeve të tjera, jo më shumë se	0.5
Lëndë minerale, jo më shumë se	0.5
Fletë me lule të shkoqura nga kërçelli, jo më shumë se	5
Pjesë të copëtuara që kalojnë në sitën me dimatër 2 mm, jo më shumë se	3

BIME ETEROVAJORE Bar mendër e pa shkoqur dhe e shkoqur	Herba menta piperitae Herba menthae piperitae gerebelt
--	---

Kërkesat cilësore

Treguesit organo-shqisore

Treguesit	Karakteristikat	Karakteristikat
	E pa shkoqur	E shkoqur
Pamja	Bar i thatë, i pastër, i lulëzuar 70-80%, i mbuluar me fletë (pjesërisht të thyera), pa rrënjë, pa pjesë të verdha dhe pa përzierje me barërat e tjerë.	Lule e fletë të shkoqura nga kërcelli, që kalojnë në sitën me dimatër 4 mm, të pastruara nga bishtat e lëndëve të huaja. Risitet në sitën me dimatër 2 mm për heqjen e pluhurit.
Era, shija	Karakteristike e vetë bimës	
	E pa shkoqur	E shkoqur
Ngjyra	Lule rozë, gjethet jeshile, deri në jeshile të errët. Kërcelli dhe damarët e fletëve ngjyrë manushaqe.	Lule rozë, gjethet jeshile, jeshile të çelur dhe jeshile të mbyllur.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %	
Lagështira, jo më shumë se	14	14
Lëndë organike të vetë bimës, jo më shumë se	2	2
Barëra të llojeve të tjera, jo më shumë se	0.5	0.5
Lëndë minerale, jo më shumë se	1	1
Pjesë të copëtuara që kalojnë në sitën me diametër 2 mm, jo më shumë se	3	1
Farëra të vetë bimës, jo më shumë se	0	1

BIME ETEROVAJORE Timus i kultivuar i shkoqur	Herba Thymus Vulgaris (gereblet)
--	---

Kërkesat cilësore

Treguesit organo-shqisore

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Herba e thatë, të shkoqura nga kërcelli, që kalojnë në sitën me dimatër 4 mm. Pasi pastrohen nga kërcelli dhe lëndët e huaja risitet në sitën me diametër 2 mm për heqjen e pluhurit. Era karakteristike e vetë bimës.
Ngjyra	Ngjyra jeshile, jeshile e çelët, ndërsa lulet natyrale. Nuk lejohen të zeza, të mykura, të kalbura dhe papastërti të ndryshme. Shmangiet nga ngjyra jo më shumë se 2%.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Lagështira, jo më shumë se	13
Kërcej të vetë bimës, jo më shumë se	3
Lëndë minerale, jo më shumë se	1

BIME ETEROVAJORE Trumëz kopeshi e shkoqur	Herba Saturejae hortensis gerebelt Satureja hortensis L. f labiatae
--	--

Kërkesat cilësore

Treguesit organo-shqisore

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Fletët dhe lulet të thara, të shkoqura nga kërcelli dhe kalohen në sitën me vrima 4 mm, pastrohen nga bishtat e copëtuar dhe lëndët e huaja dhe risitet me sitën 0.5 mm për heqjen e pluhurit. Aroma dhe shija karakteristike të vetë bimës.
Ngjyra	E gjelbër, e gjelbër e çelët, lule rozë në bojëqielli. Nuk lejohen të mykura, të kalbura dhe çdo lloj papastërti tjetër.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Lagështira, jo më shumë se	13
Lëndë organike të vetë bimës si copa kërcelli me gjatësi deri në 2 cm, jo më shumë se	2
Lëndë minerale, jo më shumë se	0.5

BIME ETEROVAJORE Hissop i shkoqur dhe i pa shkoqur	Herba Hyssopi gerebelt Hyssopus officinale L. Labiatae
--	---

Kërkesat cilësore*Treguesit organo-shqisore*

Treguesit	Karakteristikat	
	Bar hissopi i pa shkoqur	Bar hissopi i shkoqur
Pamja	Bar i thatë, i pastër, i zhvilluar i plotë dhe pjesërisht me lule dhe gjethe të shkoqura me gjatësi 15-35 cm, pa rrënjë.	I thatë i shkoqur nga kërcelli, kalohet në sitën me dimatër 4 mm, pastrohet nga kërcëjt e copëtuar dhe lëndët e huaja dhe risitet në sitën me dimatër 0.5 mm, për heqjen e pluhurit.
Era, shija	Karakteristike e vetë bimës	
	E pa shkoqur	E shkoqur
Ngjyra	Lule të kaltra deri në vjollcë të hapur. Gjethet dhe kërcelli jeshile e errët, jeshile e çelët dhe jeshile deri në të verdhë.	Jeshile, jeshile e çelët, jeshile deri në të verdhë.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %	
	I pashkoqur	I shkoqur
Lagështira, jo më shumë se	13	13
Lëndë organike të vetë bimës, jo më shumë se	2.5	1
Lëndë organike të bimëve të tjera, jo më shumë se	1.5	0.5
Lëndë minerale, jo më shumë se	0.5	0.5
Kërcej të vetë bimës, jo më shumë se	0	1

BIME ETEROVAJORE Bar timus (listre) i njomë	Herba Thymi vulgaris recens Thymus vulgaris L. f. Labiatae
---	---

Kërkesat cilësore*Treguesit organo-shqisore*

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Korret me gjatësi të ndryshme. Kërçelli i mbuluar me gjethe e lule të çelura në masën 75%, pjesa tjetër me gonxhe. Era karakteristike e vetë bimës.
Ngjyra	Gjethet dhe kërçelli me ngjyrë jeshile dhe jeshile të çelur, ndërsa lulet me ngjyrë rozë të manushaqes. Nuk lejohen të mykura dhe të kalbura.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Lëndë organike të vetë bimës, jo më shumë se	4
Lëndë minerale, jo më shumë se	1
Lëndë organike të bimëve të tjera, jo më shumë se	2

BIME ETEROVAJORE Bar timus (listre) i thatë	Herba Thymi vulgaris tot Thymus vulgaris L. f. Labiatae
---	--

Kërkesat cilësore*Treguesit organo-shqisore*

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Herba të thata, të pastra, të zhvilluara plotësisht dhe pjesërisht lule e gjethë të shkoqura. Korret me gjatësi 10-30 cm, pa rrënjë. Era karakteristike e vetë bimës.
Ngjyra	Gjethet dhe kërcelli me ngjyrë jeshile dhe jeshile e errët, jeshile e çelur, lulet me ngjyrë manushaqe deri në të çelët. Nuk lejohen të mykura dhe të kalbura. Shmangie ngjyre lejohen jo më shumë se 4%.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Lagështira, jo më shumë se	14
Bimë me lule të farëzuara, jo më shumë se	6
Lëndë organike të bimëve të tjera, jo më shumë se	2
Bimë me rrënjë dhe lëndë organike të vetë bimës dhe të bimëve të tjera, jo më shumë se	3

BIMË MJEKËSORE Bar arrsi (teukrimi)	Herba Teucree i chamaedryos Teucrium chamaedrys L.f. Labiatae
---	--

Kërkesat cilësore*Treguesit organo- shqisorë*

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Maja të thata, të lulëzuara dhe pjesërisht me gonghe, pa rrënjë dhe farëzime duke mbajtur fletë dhe lule me gjatësi 10-15 cm, pa aromë, e me shije rrudhëse.
Ngjyra	Kërçelli dhe fletët të gjelbërta, lulet në rozë. Nuk lejohen të nxira, të mykura, trup dhe fletë krejtësisht të verdha dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fiziko – kimik

Treguesit	Norma %
Lagështia, jo më shumë se	12
Bar me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	5
Bar dhe lule të coptuara, që kalojnë në sitën me diametër 2 mm, jo më shumë se	3
Lëndë organike të vetë bimës si herba me rrënjë, të farëzuara të bimëve të tjera, jo më shumë se	2
Lëndë minerale, jo më shumë se	0,5

BIMË MJEKËSORE Bar barpate	Herba Polygoni avicularis Polygonum aviculare L.f. Polygonaceae
--------------------------------------	--

Kërkesat cilësore*Treguesit organo- shqisore*

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Bar me lule dhe fletë me gjatësi 10 – 25 cm, pa rrënjë, kërcelli në formë xhufke ose tufe, pa aromë dhe shije.
Ngjyra	Gjethet dhe kërcelli ngjyrë jeshile, lulet të kuqe në rozë. Nuk lejohen të mykura, të kalbura, të nxira, rrënjë të prekura nga insektet dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fiziko – kimik

Treguesit	Norma %
Lagështia, jo më shumë se	12
Bar me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	4
Bar me rrënjë, jo më shumë se	2
Lëndë organike të bimëve të tjera, jo më shumë se	1
Lëndë minerale, jo më shumë se	1

BIMË MJEKËSORE Bar Barblete	Herba Melissa tot. Melissa officinalis L.f. Labiatae
---------------------------------------	---

Kërkesat cilësore

Treguesit organo- shqisore

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Bar i thatë, i pastër, pjesërisht i lulëzuar. Kërçelli i mbuluar me fletë të plota dhe pjesërisht të coptuara, pa rrënjë. Aroma dhe shija karakteristike e vetë bimës (limoni).
Ngjyra	E gjelbër, e gjelbër e errët me nuancë të lehta në të verdhë. Nuk lejohen fletë të nxira, të mykura, të kalbura dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fiziko – kimik

Treguesit	Norma %
Lagështia, jo më shumë se	13
Përmbajtja në hi, jo më shumë se	13
Bar me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	5
Fletë dhe kërcenj të shkoqur, që kalojnë në sitën me diametër 3 mm, jo më shumë se	5
Lëndë organike të vetë bimës, jo më shumë se	2
Lëndë organike të bimëve të tjera jo helmuese, jo më shumë se	1
Lëndë minerale, jo më shumë se	0,5

BIMË MJEKËSORE Bar bisht kali	Herba Equiseti arvensis Equisetum arvense L.f. Equisetaceae
---	--

Kërkesat cilësore*Treguesit organo- shqisore*

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Bar i thatë, pa rrënjë, i pastër, me gjatësi 10-25 cm, e plotë dhe pjesërisht e coptuar, Pa aromë dhe pa shije, në prekje me dhëmb të mpin.
Ngjyra	E gjelbër, e gjelbër në të çelur, në nyje me disa pika në kafe. Nuk lejohen të nxira, të mykura, të kalbura dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fiziko – kimik

Treguesit	Norma %
Lagështia, jo më shumë se	12
Bar me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	3
Lëndë organike të vetë bimës, jo më shumë se	3
Pjesë të bisht kalit, lloje të tjerë dhe të bimëve të tjera, jo më shumë se	2
Lëndë minerale, jo më shumë se	0,5
Përmbajtja në hi, jo më shumë se	15

BIMË MJEKËSORE Bar çaj mali	Herba Sideritidis Sideritis roeseri BOIS et HELD.R.f. Labiatae
--	---

Kërkesat cilësore

Treguesit organo- shqisore

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Bar i thatë kërcelli me gjethe e lule të vegetacionit të vitit në vazhdim me gjatësi 20-30 cm, pa fare, pa rrënjë dhe jo i drurëzuar. Aroma specifike e vetë bimës e këndshme.
Ngjyra	Fletët dhe kërcelli të gjelbër në bojë hiri, lulja e verdhë në krem. Nuk lejohen të nxira, të mykura, të kalbura dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fiziko – kimik

Treguesit	Norma %
Lagështia, jo më shumë se	12
Bar me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	5
Lëndë organike të vetë bimës dhe të bimëve të tjera jo helmuese, jo më shumë se	2
Lëndë minerale, jo më shumë se	1

BIMË MJEKËSORE Bar hithre	Herba Urticae Urtica dioica L. Urticaceae
-------------------------------------	--

Kërkesat cilësore*Treguesit organo- shqisorë*

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Bar i thatë, i pastër, me fletë të plota e pjesërisht të coptuara, me gjatësi 15-30 cm. Herba pa rrënjë dhe të pa farëzuara. Aroma dhe shija karakteristike të vetë bimës.
Ngjyra	E gjelbër, e gjelbër e çelur, deri në të errët dhe e gjelbër me nuancë të verdha. Nuk lejohen fletë të nxira, të mykura, të kalbura, të verdha dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fiziko – kimik

Treguesit	Norma %
Lagështia, jo më shumë se	14
Bar me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	5
Pjesë të herbës të coptuara, që kalojnë në sitën me diametër 3 mm, jo më shumë se	5
Lëndë organike të vetë bimës, jo më shumë se	5
Lëndë të bimë të tjera, jo më shumë se	2
Lëndë minerale, jo më shumë se	1

BIMË MJEKËSORE Bar jonxhe e egër	Herba meliloti Melilotus officinalis (L). MEDIK. F. Leguminosae
---	--

Kërkesat cilësore

Treguesit organo- shqisore

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Bar të thatë, kërcelli i mbuluar, me fletë e lule me gjatësi deri në 40 cm. Herba të ketë lule të çelura dhe pjesërisht të pa çelura (gonxe). Me aromë të këndshme të vetë bimës.
Ngjyra	Lule të verdha, fletët dhe kërcelli i gjelbër. Nuk lejohen fletë të nxira, të mykura, të kalbura dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fiziko – kimik

Treguesit	Norma %
Lagështia, jo më shumë se	13
Bar me gjatësi deri në 50 cm, jo më shumë se	8
Lule dhe fletë të shkoqura në ballo, jo më shumë se	5
Bar me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	4
Pjesë të bimëve të tjera por jo helmuese, jo më shumë se	1
Lëndë minerale, jo më shumë se	0,5
Përmbajtja në hi, jo më shumë se	6

BIMË MJEKËSORE Bar kinë fushe	Herba Centaurii Centaurium minus MOENCf, Gentianaceae
--	--

Kërkesat cilësore*Treguesit organo- shqisorë*

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Majra të lulëzuara, të thara në hije, me fletë dhe lule të pa farëzuara, pa rrënjë të prera, me gjatësi 15-30 cm, pa aromë, me shije të hidhur.
Ngjyra	Trupi dhe fletët të gjelbëra me nuancë lehtësisht në të verdhë, lulet me bojë rozë. Nuk lejohen herba të nxira, të mykura, të kalbura, herba me fara, rrënjë dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fiziko – kimik

Treguesit	Norma %
Lagështia, jo më shumë se	13
Bar me fletë të copëtuara që kalojnë në sitën me diametër 2mm, jo më shumë se	2
Bar me me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	3
Kërcell të xhveshur nga lulet dhe fletët të rëna në ballo, jo më shumë se	7
Lëndë organike të vetë bimës dhe të bimëve të tjera, jo më shumë se	2
Lëndë minerale, jo më shumë se	0.5

BIMË MJEKËSORE Bar lulebasani	Herba Hyperici Hypericum perforatum L.f, Hypericaceae
--	--

Kërkesat cilësore

Treguesit organo- shqisore

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Majra të lulëzuara të pastëra, me gjatësi 20 – 30 cm. Kërçelli pa rrënjë i degëzuar por jo i drunjtë. Fletët dhe lulet pjesërisht të shkëputura nga degët.
Ngjyra	Kërçelli ngjyrë të gjelbër të çelur, e gjelbër në rozët, fletët të gjelbëra e gjelbër e çelur dhe lulja e verdhë natyrale. Nuk lejohen të nxira, të mykura, të kalbura krejtësisht dhe të farëzuara si dhe çdo lloj papastërtie tjetër.

Treguesit fiziko – kimik

Treguesit	Norma %
Lagështia, jo më shumë se	13
Bar me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	5
Bar lule dhe fletë të coptuara, që kalojnë në sitën me diametër 3 mm, jo më shumë se	5
Bar i lulëzuar dhe pjesërisht të farëzuara, jo më shumë se	5
Bar me gjatësi mbi 30 cm, jo më shumë se	5
Lëndë organike të vetë bimës dhe të bimëve të tjera, jo më shumë se	1
Lëndë minerale, jo më shumë se	0,5

BIMË MJEKËSORE Bar mendër e egër	Herba Pulegii Mentha pulegium L.f, Labiatae
--	--

Kërkesat cilësore*Treguesit organo- shqisoreë*

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Maja të thata, të lulëzuara dhe pjesërisht me gonxhe, pjesërisht të coptuara, pa rrënjë dhe farëzime, kërcelli të jetë me fletë e lule me gjatësi 20-30 cm. Aroma e këndëshme, specifike e vetë bimës.
Ngjyra	Kërcelli dhe fletët ngjyrë të gjelbër, të hirtë, lulet vjollcë. Nuk lejohen të nxira, të mykura, të kalbura, trup dhe fletë krejtësisht të verdha dhe çdo lloj papastërtie tjetër.

Treguesit fiziko – kimik

Treguesit	Norma %
Lagështia, jo më shumë se	12
Bar me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	6
Bar i tejlulëzuar, i farëzuar dhe pa lule, jo më shumë se	6
Kërcell dhe lule e fletë të shkoqura, jo më shumë se	3
Lëndë të bimëve të tjera aromatike, jo më shumë se	1
Lëndë minerale, jo më shumë se	1

BIMË MJEKËSORE Mendër e egër e shkoqur	Herba Menthae pulegii gerebelt Mentha pulegium L.f, Labiatae
---	---

Kërkesat cilësore

Treguesit organo- shqisore

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Fletët dhe lulet të thara, të shkoqura nga kërcelli dhe që kalohen në sitën me diametër 4 mm, pastrohen nga bishtat, lëndët e huaja dhe risiten në sitën me diametër 0,5 mm për heqjen e pluhurit. Aroma e këndëshme, specifike e vetë bimës.
Ngjyra	E gjelbër, e gjelbër në të hirtë e vjollcë, vjollcë e çelur. Nuk lejohen të nxira, të mykura, të kalbura dhe çdo lloj papastërtie tjetër.

Treguesit fiziko – kimik

Treguesit	Norma %
Lagështia, jo më shumë se	13
Fletë dhe lule me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	3
Lëndë organike të vetë bimës (kërcej), por jo më të gjatë se 2 cm, jo më shumë se	3
Lëndë minerale në pluhur, jo më shumë se	0,5

BIMË MJEKËSORE Bar mendre gjethegjatë	Herba Menthae longifolia Mentha longifolia (L) HUDS f, Labiatae
--	--

Kërkesat cilësore*Treguesit organo- shqisore*

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Bar i thatë i mbushur me lule dhe fletë të plota dhe pjesërisht të shkoqura pa rrënjë dhe farëzime, herba me gjatësi 25 – 35 cm. Aromë specifike e vetë bimës.
Ngjyra	Kërçelli dhe gjethet të gjelbëra në të hirtë lulet krem në të bardhë. Nuk lejohen të nxira, të mykura, të kalbura, bimë të tjera aromatike dhe çdo lloj papastërtie tjetër.

Treguesit fiziko – kimik

Treguesit	Norma %
Lagështia, jo më shumë se	12
Bar me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	6
Maja të kalbura lulëzimi, të farëzuara dhe pa lule, jo më shumë se	6
Kërçell me fletë e lule të shkoqura, jo më shumë se	3
Lëndë të bimëve të tjera, jo aromatike, jo më shumë se	1
Lëndë minerale, jo më shumë se	1

BIMË MJEKËSORE Tufa mersine	Summitates Myrti Myrtus communis L.f, Myrtaceae
--	--

Kërkesat cilësore

Treguesit organo- shqisore

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Bar i thatë, pa fletë të verdha, dega e mbushur me fletë e lule me gjatësi 10-20 cm, por jo i drunjëzuar, me trashësi 12 mm. Aroma dhe shija specifike e vetë bimës.
Ngjyra	Filizat dhe fletët të gjelbëra, të gjelbëra në gri, lule të bardha në të murme. Nuk lejohen të nxira, të mykura, të kalbura dhe çdo lloj papastërtie tjetër.

Treguesit fiziko – kimik

Treguesit	Norma %
Lagështia, jo më shumë se	13
Bar me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	8
Bar që kalon gjatësinë 20 cm dhe trashësinë 12 mm, jo më shumë se	10
Lëndë minerale, jo më shumë se	1

BIMË MJEKËSORE Bar mijë fletësh	Herba Millefolii Achillea millefolium L. f. Compositae
--	---

Kërkesat cilësore

Treguesit organo- shqisorë

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Bar i thatë dhe plot me gjethe e lule, 15-30 cm gjatësi, lulesa e lulëzuar por jo e farëzuar. Lulet dhe fletët pjesërisht të shkoqura. Aroma karakteristike e vetë bimës.
Ngjyra	Lulesa me petale të bardha dhe në qendër e verdhë, kërcelli dhe fletët jeshile me push të hollë gri. Nuk lejohen të nxira, të mykura, të kalbura, pjesërisht të farëzuara dhe çdo lloj papastërtie tjetër.

Treguesit fiziko – kimik

Treguesit	Norma %
Lagështia, jo më shumë se	13
Bar me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	3
Lëndë organike të vetë bimës ose të bimëve të tjera por jo helmuese, jo më shumë se	1
Bar të farëzuar mbi 10% të luleve, jo më shumë se	5
Bar nga llojet e tjera të mijë fletësheve, jo më shumë se	2
Bar me gjatësi deri 40 cm, jo më shumë se	5

BIME MJEKESORE Bar pelini i bardhë	Herba Absinthii Artemisia absinthium L.f Compositae
--	--

Kërkesat cilësore

Treguesit organo-shqisore

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Bar i thatë, gjysëm i lulëzua, i zhvilluar. Kërçelli mbuluar me fletë, me lule dhe pjesërisht gonxhe, gjatësia 20-35 cm, aroma e vetë bimës, me shije të hidhur.
Ngjyra	Kërçelli dhe gjethet jeshile në gri, lulet të verdha. Nuk lejohen të kalbura, të mykura, të nxira, dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Lagështira, jo më shumë se	10
Bar me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	3
Dege me kërçell mbi 5 mm, trashësi si dhe dege të farëzuara, jo më shumë se	3
Lëndë të bimëve të tjera, jo më shumë se	1
Lëndë minerale, jo më shumë se	1

BIME MJEKËSORE Bar pelini i zi	Herba Artemisiae vulgaris Artemisia vulgaris L.f Compositae
--	--

Kërkesat cilësore*Treguesit organo-shqisore*

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Bar i thatë, i pastër, i zhvilluar, majat gjysëm të lulëzuara. Kërçelli i mbuluar me gjethe, dhe lule pjesërisht gonxhe, gjatësia 20-35 cm, aroma e vetë bimës, me shije të hidhur.
Ngjyra	Kërçelli dhe gjethet jeshile në gri, lulet të verdha, të kuqerremta. Nuk lejohen të kalbura, të mykura, të nxira, dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Lagështira, jo më shumë se	13
Bar me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	3
Dege me kërçell mbi 5 mm, trashësi si dhe dege të farëzuara, jo më shumë se	3
Lëndë të bimëve të tjera, jo më shumë se	1
Lëndë minerale, jo më shumë se	1

BIME MJEKËSORE Bar qumështore	Herba Taraxaci Taraxacum officinale WEB f. Compositae
---	--

Kërkesat cilësore

Treguesit organo-shqisore

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Bar rrënjë dhe fletë të thata, të pastra, të zhvilluara, të plota dhe pjesërisht të copëtuara, me dimensione të ndryshme. Aroma karakteristike e vetë bimës.
Ngjyra	Rrënjë bojë kafe në të verdhë, kafe të çelur, nga brenda e bardhë në krem me zemër të verdhë. Fleta jeshile e errët, jeshile të çelur. Nuk lejohen të mykura, të kalbura, të nxira, të prekura, nga insektet jo karantinore dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Lagështia, jo më shumë se	14
Bar me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	3
Lëndë organike të bimëve të tjera, jo më shumë se	1
Përmbajtja në hi, jo më shumë se	8
Lëndë minerale, jo më shumë se	0.5

BIME MJEKESORE Bar rigon i kuq	Herba Origani vulgaris tot. Origanum vulgare L. f Labiatae
--	---

Kërkesat cilësore*Treguesit organo-shqisore*

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Maja gjysëm të lulëzuara, të thata, te pa fërzuar, me gjatësi 20-30 cm. Kërçelli do të përmbajë gjethe dhe lule me aromë të këndëshme karakteristike të vetë bimës.
Ngjyra	Fletët të gjelbëra të errëta, kërçelli i gjelbër, i gjelbër në të kuqërremtë, lulet rozë. Nuk lejohen të kalbura, të mykura, të nxira, dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Lagështira, jo më shumë se	13
Lule dhe fletë që kalojnë në sitën me diametër 3 mm, jo më shumë se	5
Bar me ngjyrë jo normale dhe të farëzuara, jo më shumë se	5
Kërçell të zhveshur nga lulet dhe fletët të rëna, jo më shumë se	7
Lëndë organike dhe të bimëve të tjera, jo më shumë se	1
Lëndë minerale, jo më shumë se	1

BIME MJEKESORE Bar rigon i bardhë	Herba Origani viridis tot. Origanum vulgare ssp. Viridis BOIS f. Labiatae
--	--

Kërkesat cilësore*Treguesit organo-shqisore*

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Maja gjysëm të çelura të thata, te pafarëzuara me gjatësi 20-30 cm. Kërçelli të përmbajë gjethe me aromë te këndëshme karakteristike të vetë bimës.
Ngjyra	Fletë të gjelbëra, të gjelbra të errëta, kërçelli i gjelbër në të kuqërremtë, lulet të bardha. Nuk lejohen të nxira, të mykura, të kalbura dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Lagështira, jo më shumë se	13
Lule dhe fletë që kalojnë në sitën me diametër 2 mm, jo më shumë se	5
Bar me ngjyrë jo normale dhe të farëzuara, jo më shumë se	5
Lule dhe fletë të rëna nga kërçelli, jo më shumë se	7
Lëndë organike dhe të bimëve të tjera, jo më shumë se	1
Lëndë minerale, jo më shumë se	1

BIME MJEKESORE Rigon i bardhë i shkoqur	Herba origani viridis gerebelt Origanum vulgare ssp. Viridis BOIS f. Labiatae
---	--

Kërkesat cilësore

Treguesit organo-shqisore

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Fletë dhe lule të thara, shkoqen nga kërcelli dhe kalohen në sitën me diametër 4 mm, pastrohen nga bishtat e copëtuara dhe lëndët e huaja dhe risiten me sitën me diametër 0.5 mm për heqjen e pluhurit. Aroma dhe shija karakteristike e vetë bimës.
Ngjyra	Fletë e gjelbër e gjelbër e çelur. Lulja e bardhë e bardhë në krem. Nuk lejohen të mykura, të kalbura dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Lagështira, jo më shumë se	13
Pjesë të bimës me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	3
Lëndë organike të vetë bimës, (kërcenj) por jo më të gjatë se 2 cm, jo më shumë se	3
Lëndë minerale, jo më shumë se	0.5

BIME MJEKESORE Bar trumze	Herba Saturejae montanae tot Satureja Montana L.f Labiatae
-------------------------------------	---

Kërkesat cilësore*Treguesit organo-shqisorë*

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Bar i thatë, i mbushur me gjethe e lule, të plota dhe pjesërisht të copëtuara me gjatësi 15-30 cm. Aroma e këndëshme, specifike e vetë bimës.
Ngjyra	Kërçelli dhe gjethet të gjelbërta, e gjelbërt e çelur, lulja natyrale bojë qielli. Nuk lejohen të nxira, të mykura, të kalbura dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Lagështira, jo më shumë se	12
Bar me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	5
Bar, fletë dhe lule të copëtuara, që kalojnë në sitën me diametër 2 mm, jo më shumë se	5
Lëndë organike dhe të bimëve të tjera, jo më shumë se	2
Lëndë minerale, jo më shumë se	0.5

BIME MJEKESORE Bar zhumbrice	Herba serpylli tot Thymus serpyllum HAL f. labiatea
--	--

Kërkesat cilësore*Treguesit organo-shqisorë*

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Bar i lulëzuar, i thatë i korrur pa rrënjë, kërcelli duhet të mbajë fletë dhe lule të plota dhe pjesërisht të rëna. Aroma karakteristike e vetë bimës.
Ngjyra	E gjelbër, e gjelbër në të errët, ndërsa lulet natyrale violet të çelura. Nuk lejohen të nxira, të mykura, të kalbura dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Lagështira, jo më shumë se	12
Kërcelli pa fletë dhe me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	5
Bimë me lule në gongxe dhe të farëzuara, jo më shumë se	5
Bimë me rrënjë dhe lëndë organike të bimëve të tjera, jo më shumë se	4
Bar pa lule, jo më shumë se	10
Lëndë minerale, jo më shumë se	2

BIME MJEKESORE Zhumbricë e shkoqur	Herba serpylli gerebelt Thymus serpyllum HAL. F. Labiatae
--	--

Kërkesat cilësore

Treguesit organo-shqisore

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Bimë të thata, të shkoqura, nga kërcelli kalohen në sitën me diametër 4 mm, pastrohen nga kërcëjtë e copëtuar, dhe lëndët e huaja dhe risiten në sitën me diametër 0.5 mm për heqjen e pluhurit. Aroma karakteristike e vetë bimës.
Ngjyra	E gjelbër, e gjelbër në të errët ndërsa lulet natyrale violet të çelur. Nuk lejohen të nxira, të mykura, të kalbura dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Lagështira, jo më shumë se	12
Pjesë të bimës me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	5
Kërcenj të vetë bimës jo më të gjatë se 2 cm, jo më shumë se	5
Lëndë minerale, jo më shumë se	1

BIME MJEKESORE Bar majdanoz i egër	Herba Capilli veneris Adiantum capillus – veneris L.f Polypodiaceae
--	--

Kërkesat cilësore

Treguesit organo-shqisorë

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Bar me kërcenj të fortë dhe gjethe 2-3 fish pendorë, me gjetheza në formë trekëndëshi, me bazë në formë pyke dhe me maje me 3-4 vringuj që përfundojnë me buzë të dhëmbëzuara. Sipërfaqja e gjetheve me rrudha vizake që dalin nga baza e gjetheve ose përfundojnë në majë të saj. Kërçelli nën gjethe e fundit nuk duhet të jetë më i gjatë se 20 cm. Era karakteristike e vetë bimës shija pak e athët e hidhur.
Ngjyra	Kërcenj ngjyrë të zezë të shkëlqyeshme, gjethet të gjelbëra deri në të gjelbër të çelët. Pranohen njolla kafe të murrme në majë të sipërfaqes së poshtme të gjetheve. Nuk lejohen të nxira, të mykura, të kalbura dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Lagështira, jo më shumë se	15
Bar me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	3
Kërcenj me gjatësi mbi 20 cm nga gjetheja e fundit, jo më shumë se	1
Pjesë nga bimë të tjera, jo më shumë se	2
Hiri i pergjithshem, jo më shumë se	12

BIME MJEKËSORE Trumzë e shkoqur	Herba saturejae montanae Gerbeli Satureja Montana L. f Labiatae
---	--

Kërkesat cilësore

Treguesit organo-shqisore

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Fletët dhe lulet të thata, shkoqur nga kërcelli dhe kalojnë në sitën me diametër 3 mm, pastrohen nga bishtat e copëtuara e lëndët e huaja dhe risiten në sitën me diametër 0.5 mm, për heqjen e pluhurit. Aroma dhe shija karakteristike e vetë bimës.
Ngjyra	E gjelbër, e gjelbër e çelët, lulet ngjyrë rozë në bojë qielli. Nuk lejohen fletë të nxira, të mykura, të kalbura dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Lagështira, jo më shumë se	12
Fletë me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	3
Lëndë organike të vetë bimës si copa kërcelli me gjatësi deri në 2 cm, jo më shumë se	2
Lëndë minerale, jo më shumë se	0.5

BIME MJEKËSORE Rigon i kuq i shkoqur	Herba Origani vulgaris gereblt Origanum vulgare L.f. Labiatae
--	--

Kërkesat cilësore

Treguesit organo-shqisorë

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Fletë dhe lule të thata, të shkoqura nga kërcelli dhe kalohen në sitën me diametër 4 mm, pastrohen nga bishtat e copëtuara dhe lëndët e huaja, risiten në sitën me diametër 5 mm për heqjen e pluhurit. Aroma dhe shija karakteristike të vetë bimës.
Ngjyra	Fletë të gjelbra, të gjelbra në gri, lulja rozë deri në manushaqe. Nuk lejohen të nxira, të mykura, të kalbura dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Lagështira, jo më shumë se	13
Pjesë të bimës me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	5
Fletë dhe lule të copëtuara që bien në sitën me diametër 3mm, jo më shumë se	5
Lëndë minerale, jo më shumë se	0.5

BIME MJEKESORE Bar purqarku	Herba Nastrutii Nasturtium officinale L.f Cruciferae
--	---

Kërkesat cilësore

Treguesit organo-shqisore

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Herba me lule dhe fletë të plota dhe pjesërisht të copëtuara me gjatësi 15-30 cm, e thatë e pastër. Aroma dhe shija karakteristiek të vetë bimës.
Ngjyra	Kërçelli i gjelbër me nuancë të verdhë në kafe. Fletët të gjelbra, e çelët. Lulja e bardhë dhe e bardhë në krem. Nuk lejohen të nxira, të mykura, të kalbura dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Lagështira, jo më shumë se	13
Herba me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	5
Lëndë organike të vetë bimës, jo më shumë se	3
Fletë dhe lule të copëtuara që bien nën sitën me diametër 3 mm, jo më shumë se	5
Lëndë minerale, jo më shumë se	0.5

BIME MJEKËSORE Bar eupatorie	Herba Eupatorii cannabinus Eupatorium CanabinusL.f Compositae
--	--

Kërkesat cilësore*Treguesit organo-shqisurë*

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Herba me lule e fletë të plota dhe pjesërisht të copëtuara, me gjatësi 15-35 cm, e thatë, e pastër. Aroma dhe shija karakteristike e vetë bimës.
Ngjyra	Kërçelli i gjelbër, i gjleber ne trendafili me nuancë gri. Fleta e gjelbër, e gjelbër e çelët me nuancë gri. Lulja rozë, rozë në krem. Nuk lejohen të nxira, të mykura, të kalbura dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Lagështira, jo më shumë se	13
Herba me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	5
Lëndë organike të vetë bimës dhe bimeve të tjera, jo më shumë se	3
Fletë me lule të copëtuara që bien nën sitën me diametër 3 mm, jo më shumë se	5
Lëndë minerale, jo më shumë se	0.5

BIME MJEKESORE Bar parietare	Herba parietariae Parietaria officinalis L.f Urticaceae
--	--

Kërkesat cilësore

Treguesit organo-shqisore

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Herba me lule dhe fletë të plota dhe pjesërisht të copëtuara me gjatësi 15-30 cm, e thatë, e pastër. Armoma dhe shija karakteristike e vetë bimës.
Ngjyra	Fletët të gjelbëra, e gjelbër e errët dhe e gjelbër në të çelët. Kërçelli i gjelbër në kafe me nuancë gri. Lulja e bardhë në krem me nuancë rozë. Nuk lejohen të nxira, të mykura, të kalbura dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Lagështira, jo më shumë se	13
Herba me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	5
Lëndë organike të vetë bimës ose bimeve të tjera, jo më shumë se	4
Fletë dhe lule të shkoqura që bien në sitën me diametër 3 mm, jo më shumë se	5
Lëndë minerale, jo më shumë se	1

BIME MJEKËSORE Bar fomi mjekësore	Herba fumareae Fumaria officinalis L.f Papaveraceae
---	--

Kërkesat cilësore*Treguesit organo-shqisore*

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Herba me lule e fletë të plota e pjesërisht të copëtuara, me gjatësi 15-30 cm, e thatë, e pastër. Aroma dhe shija karakteristike e vetë bimës.
Ngjyra	Kërçelli dhe fletët të gjelbër, të gjelbër me nuancë të verdhë. Lule të kuqe, të kuqe në vishnje e blu. Nuk lejohen të nxira, të mykura, të kalbura dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Lagështira, jo më shumë se	12
Kërçenj pa fletë dhe me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	5
Herba me lule në gonxhe dhe të farëzuara, jo më shumë se	5
Herba me rrënjë dhe lëndë organike të vetë bimës e të bimëve të tjera, jo më shumë se	4
Lëndë minerale, jo më shumë se	2

BIME MJEKESORE Bar cucubine	Herba Sisymbri Sisymbrium officinale L.f cruciferae
---------------------------------------	--

Kërkesat cilësore

Treguesit organo-shqisorë

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Herba me lule e fletë të plota dhe pjesërisht të copëtuara. Aroma dhe shija e vetë bimës.
Ngjyra	Kërçelli dhe fletët e gjelbërta, e gjelbër e hapët me nuancë në të verdhë e gri. Lulja e bardhë në krem. Nuk lejohen të nxira, të mykura, të kalbura dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Lagështira, jo më shumë se	13
Herba me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	5
Herba me lëndë të huaja të vetë bimës dhe bimeve të tjera, jo më shumë se	3
Fletë dhe lule të shkoqura që bien në sitën me diametër 3 mm, jo më shumë se	5
Lëndë minerale, jo më shumë se	0.5

BIME MJEKESORE Kallinj të frutifikuar të gjethe dellit të gjerë	Frystus plantaginis majoris Plantago major L.f Plantaginaceae
---	--

Kërkesat cilësore

Treguesit organo-shqisorë

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Kallinj me gjatësi të ndryshme, të mbushur dendësisht me fruta, pjesa me fruta e bishtit të kallirit nuk duhet të jetë më e gjatë se 3 cm. Pa erë e shije të veçantë.
Ngjyra	Bishti i kallirit ka ngjyrë të gjelbër vaji, vetë frutat që përbëjnë kallirin kanë ngjyrë bezhë deri në vaj ulliri, ndërsa farërat e vogla (që ndodhen brenda frutit) të zeza. Nuk lejohen fruta të nxira, të mykura, të kalbura dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Lagështira, jo më shumë se	12
Kallinj me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	8
Fruta të shkoqura, jo më shumë se	15
Kallinj me pjesë të pafrutifikuar me gjatësi mbi 3 cm, jo më shumë se	5
Lëndë minerale, jo më shumë se	0.5

BIME MJEKESORE Kokërr dëllinjë e kuqe	Fructus Juniperi oxycedri Juniperus oxcedrus L.f Cupressaceae
---	--

Kërkesat cilësore*Treguesit organo-shqisore*

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Kokrra të pjekura, të rrumbullakta me cipë të ndriteshme me madhësi të ndryshme dhe pa kokërra të thata të vegjetacionit të kaluar.
Ngjyra	E kuqe dhe e kuqe me nuancë të lehtë në të verdhë. Nuk lejohen kokrra të kalbura, të mykura, të nxira, dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Lagështira, jo më shumë se	20
Kokrra me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	5
Lëndë organike të vetë bimës ose të bimëve të tjera jo helmuese, jo më shumë se	1
Kokrra të thata, jo më shumë se	2
Kokrra të dëmtuara mekanikisht, jo më shumë se	5
Hiri, jo më shumë se	5
Vaj eterik, jo më shumë se	0.8
Lëndë minerale, jo më shumë se	1

BIME MJEKESORE Kokërr dëllinjë e zezë	Fructus juniper Communis Juniperus communis l.f Cupressaceae
---	---

Kërkesat cilësore*Treguesit organo-shqisore*

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Kokrra të rrumbullakta të ndritëshme me diametër mbi 4 mm, të tulëta, përsipër kanë një brazdë me tri rreze, në rreze gjendet gjysma e bishtit. Erë aromatike, shije djegëse dhe të ëmbël.
Ngjyra	Blu e errët ose violetë e thellë. Nuk lejohen kokrra të nxira, të mykura, të kalbura, dëmtues dhe ekstremeente kafshësh.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Lagështira, jo më shumë se	20
Kokrra me ngjyrë jo normale, te papjekura dhe të dëmtuara mekanikisht, jo më shumë se	5
Lëndë organike të vetë bimës, jo më shumë se	0.5
Përzierje minerale, jo më shumë se	0.5
Hiri i plote, jo më shumë se	5
Vajra eterike, jo më pak se	0.8
Kokrra me madhësi nën 4 mm, jo më shumë se	5

BIME MJEKESORE Kokërr kulumbrie	Fructus pruni spinosae Prunus spinosa L.f Rosaceae
--	---

Kërkesat cilësore

Treguesit organo-shqisore

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Kokrra të pjekura, të thara, të shëndosha, pa bisht në formë të rrumullakët ose të rrudhosura, me diametër 1-1.5 cm. Pa erë, shije të ëmbël rrudhëse.
Ngjyra	Nga jashtë cipa blu e errët deri në te zeze, nga brenda tuli jeshil në të verdhë. Nuk lejohen kokrra të nxira, të mykura, të kalbura, te papjekura, të ngrëna nga ineskttet dhe ekstremeente kafshësh.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Lagështira, jo më shumë se	14
Kokrra të dëmtuara mekanikisht ose të shtypura, jo më shumë se	3
Kokrra të gjelbra, jo më shumë se	1
Mbeturina bishtash, jo më shumë se	1
Lëndë te huaja organike dhe lëndë minerale, jo më shumë se	0.5

BIME MJEKESORE Kokërr limoni aguridh	Fructus citri immature Citrus limon L. BUM. F. Rutaceae
--	--

Kërkesat cilësore*Treguesit organo-shqisore*

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Kokrra limoni të papjekura (aguridhe) të rëna nga pema gjatë vegetacionit, sidomos gjatë periudhës korrik-shtator me madhësi të ndryshme po me diametër jo me te vogla se 1 cm.
Ngjyra	Jeshile, jeshile në të verdhë Nuk lejohen fruta të nxira, të mykura, të kalbura dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Lagështira, jo më shumë se	11
Kokrra më të vogla në diametër se 1 cm, jo më shumë se	1
Lëndë minerale, jo më shumë se	0.5

BIME MJEKESORE Kokërr mersine	Fructus Myrti Myrtus communis L.f Murtaceae
--	--

Kërkesat cilësore

Treguesit organo-shqisore

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Kokrra të thata, të plota, me madhësi të ndryshme, të rrudhura, pa bisha, me aromë specifike të vetë bimës me shije në fillim pak të ëmbël dhe më vonë të hidhur.
Ngjyra	E zezë e errët dhe vishnje e errët. Nuk lejohen kokrra të nxira, të mykura, të kalbura dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Lagështira, jo më shumë se	14
Kokrra me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	4
Kokrra të ngrëna nga insektet, jo karantinore, jo më shumë se	1
Lëndë minerale, jo më shumë se	0.5

BIME MJEKËSORE Kokërr murrizi	Fructus crataegi Crataegus oxycantha L. dhe crataegus monogyna JACQ f. Rosaceae
---	--

Kërkesat cilësore

Treguesit organo-shqisore

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Kokrra të pjekura, të rrumbullakta ose vezake, pa bishta, me dimensione mbi 6 mm, të jenë të dy llojeve (me 1 ose 2-3 bërthama) pa erë dhe me shije të ëmbël.
Ngjyra	E kuqe e çelur ose e kuqe në vishnje. Nuk lejohen kokrra të nxira, të mykura, të kalbura dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Lagështira, jo më shumë se	12
Kokrra me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	3
Kokrra me dimensione më të vogla e 6 mm, jo më shumë se	5
Lëndë organike të vetë bimës, jo më shumë se	1
Lëndë minerale, jo më shumë se	0.5
Hiri, jo më shumë se	0.4

BIME MJEKESORE Kokërr qershie e egër (boronicë)	Fructus Myrtilli Vaccinium myrtillus L. f Ericaceae
---	--

Kërkesat cilësore*Treguesit organo-shqisore*

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Kokrra të pjekura, të zhvilluara, të thata, me madhësi të ndryshme e të shkrifëta, jo të ngjitura, pa bisht, të rrudhura por cipa jo e plasur, shija dhe aroma karakteristike e vetë bimës.
Ngjyra	Blu e errët thuajse në të zezë. Nuk lejohen të nxira, të mykura, të kalbura dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Lagështira, jo më shumë se	16
Fruta të papjekura, jo më shumë se	1
Përzierje te huaja organike, jo më shumë se	1.5
Lëndë minerale, jo më shumë se	0.5
Gjethe dhe pjesë të bishtave, jo më shumë se	1.25

BIME MJEKËSORE Kokërr shtogu	Fructus Sambuci Nigrae Sambucus nigra L.f Caprifoliaceae
--	---

Kërkesat cilësore*Treguesit organo-shqisorë*

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Kokrra të pjekura, të thata, të rrudhura, por jo të plasur cipën, kokrrat duhet të jenë të shkoqura nga bishti. Aroma dhe shija karakteristike të vetë bimës.
Ngjyra	Si brenda edhe jashtë kokrra duhet të jetë e zezë. Nuk lejohen kokrra të nxira, të mykura, të papjekura, të dëmtuara dhe ekstreme të kafshësh.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Lagështira, jo më shumë se	15
Kokrra me ngjyrë jo normale dhe me bisht, të djegura, jo më shumë se	3
Lëndë organike të vetë bimës, jo më shumë se	1
Lëndë të huaja organike e minerale, jo më shumë se	1

<p>BIME MJEKESORE</p> <p>Kokërr trëndafili i egër pa farë si dhe specie të tjera të gjinisë trëndafil por që i përgjigjen kërkesave të standardit në fuqi</p>	<p>Fructus Cynosbati sine semine Rosa canina L.f Rosaceae</p>
--	--

Kërkesat cilësore

Treguesit organo-shqisore

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Fruta të çara, të pastruara nga farat, qimet, bishtat e saj. Era thujse mungon, shija karakteristike.
Ngjyra	E kuqe, e kuqe e theksuar në të hapur dhe e kuqe në vishnje. Nuk lejohen të nxira, të mykura, të kalbura, të dëmtuara dhe ekstreme të kafshësh.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Lagështira, jo më shumë se	12
Tul me ngjyrë jo normal, jo më shumë se	5
Kokrra të paçara, jo më shumë se	3
Pjesë të tulit që mbajnë qime, fara dhe lëndë të tjera të vetë bimës, jo më shumë se	4
Përmbajtja e vitaminës C, jo me pak se	0.5
Hiri, jo më shumë se	6

BIME MJEKESORE Kokërr trendafil i egër me farë si dhe specie të tjera të gjinisë trëndafil por që i pergjigjen kërkesave te standardit ne fuqi	Fructus Cynosbati totus Rosa canina L.f Rosaceae
--	---

Kërkesat cilësore*Treguesit organo-shqisore*

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Kokrra të zhivlluara, të pjekura, me madhësi të ndryshme, pa bisht, era thujtase mungon, me shije në fillim pak të athët, më vonë të ëmbël.
Ngjyra	E kuqe, e kuqe e errët. Nuk lejohen të nxira, të mykura, të kalbura dhe ekstreme të kafshësh.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Lagështira, jo më shumë se	14
Hiri i plotë, jo më shumë se	5
Kokrra me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	5
Lëndë organike të vetë bimës e bimeve të tjera, jo më shumë se	1
Kokrra te shtypura mekanikisht, jo më shumë se	3
Lëndë organike minerale, jo më shumë se	0.5
Përmbajtja ne vitamine C, jo me pak se	0.25

BIME MJEKESORE Kokërr trendafil i egër i njomë si dhe specie të tjera të gjinisë trëndafil por që i pergjigjen kërkesave te standardit ne fuçi	Fructus Cynosbati recens Rosa canina L.f Rosaceae
---	--

Kërkesat cilësore*Treguesit organo-shqisore*

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Kokrra të njoma, të kuqe me madhësi të ndryshme, të plota, të forta, të hedhura në fuçi prej druri, në tretësirë SO ₂ .
Ngjyra	E kuqe, e kuqe e çelët. Nuk lejohen të nxira, të mykura, të shtypura dhe me papastërti të tjera.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Lëndë organike të vetë bimës, jo më shumë se	0.5
Kokrra me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	5
Kokrra me bishtat e saj nga 1-15 cm, jo më shumë se	5

BIME MJEKESORE Kokërr vadhëz e egër	Fructus Sorbi aucupariae Sorbus aucuparia L.f Rosaceae
---	---

Kërkesat cilësore*Treguesit organo-shqisore*

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Kokrra të zhvilluara, të pjekura, me madhësi rreth 6 mm, erë të dobët, shije të athët rrudhse.
Ngjyra	E kuqe. Nuk lejohen të nxira, të mykura, të kalbura, dëmtues dhe ekstreme të kafshësh.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Lagështira, jo më shumë se	14
Kokrra me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	3
Pjesë të vetë bimës, jo më shumë se	3
Kokrra të shtypura mekanikisht, jo më shumë se	3
Lëndë të huaja organike dhe minerale, jo më shumë se	0.5

BIME MJEKESORE Kokërr luleshtrydhe e njomë	Fructus Fragariae recens Fragaria vesca L.f Rosaceae
--	---

Kërkesat cilësore

Treguesit organo-shqisore

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Fruta të freskëta, të brishta, të plota, me madhësi të ndryshme, të pa shtypura, me aromë dhe shije të këndëshme specifike të vetë bimës. Të futen në fuçi prej druri me SO ₂ .
Ngjyra	E kuqe, e kuqe në nuancë të verdhë. Nuk lejohen të nxira, të mykura, të kalbura dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Fruta me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	3
Lëndë organike të vetë bimës, jo më shumë se	2
Fruta te shtypura mekanikisht, jo më shumë se	5

BIME MJEKËSORE Kokërr manaferrë e njomë	Fructus rubi fruticosi recens Rubus fruticosus L.f Rosaceae
---	--

Kërkesat cilësore

Treguesit organo-shqisorë

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Frutat pa bisht, të jenë të fresketa, të plota, me madhësi të ndryshme të pashtypura, me shije specifike të këndëshme dhe të ëmbël të manaferrës, të pjekura normalisht.
Ngjyra	E zezë, e zezë në vishnje me nuancë të hirta. Nuk lejohen të nxira, të mykura, të kalbura dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Fruta me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	3
Lëndë organike të vetë bimës, jo më shumë se	1
Fruta të shtypura mekanikisht, jo më shumë se	5

BIME MJEKESORE Kokërr qershigle e njomë	Fructus Myrtilli recens Vaccinium myrtillus L. f Ericaceae
---	---

Kërkesat cilësore*Treguesit organo-shqisore*

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Kokrra të njoma me madhësi të ndryshme, të pashtypura, e shije të ëmbël dhe pak të athët. Pa përzierje me kokrra jeshile të papjekura.
Ngjyra	Blu e errët dhe e zezë në vishnje. Nuk lejohen të nxira, të mykura, të kalbura dhe papastreti të ndryshme.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Kokrra me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	3
Kokrra të shtypura, jo më shumë se	5
Lëndë organike të vetë bimës dhe kokrra të papjekura, jo më shumë se	2

BIME MJEKËSORE Kokërr thane e njomë	Fructus Corni maris recens Cornus nas L. f Cornaceae
---	---

Kërkesat cilësore*Treguesit organo-shqisore*

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Kokrra të fresketa, pa bisht, të forta, të gjata, me madhësi të ndryshme dhe jo të shtypura, me shije karakteristike të vetë thanës, të athëta, të hidhen në fuçi prej druri në solucion SO ₂ .
Ngjyra	E kuqe, e kuqe në nuancë të lehta në të verdhë e në disa raste vishnje. Nuk lejohen të nxira, të mykura, të papjekura e të shtypura.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Kokrra me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	3
Kokrra të papjekura dhe lëndë të tjera të vetë bimës, jo më shumë se	3
Kokrra të shtypura, jo më shumë se	2

BIME MJEKESORE Kokërr dëllinjë deti	Fructus Juniperi pheniceae Juniperrus phoeniceae L. f cupressaceae
---	---

Kërkesat cilësore*Treguesit organo-shqisore*

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Kokrra të rrumbullakta, të pjekura, me madhësi të ndryshme, duke mbajtur shenjën e bishtit pa kokrra të vegjetacionit të kaluar.
Ngjyra	E kuqe, e kuqe në të verdhë. Nuk lejohen të nxira, të kimbura dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Lagështira, jo më shumë se	22
Kokrra me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	4
Lëndë organike të vetë bimës si gjëmba dhe maja degësh, jo më shumë se	2
Kokrra të shtypura mekanikisht, jo më shumë se	8
Lëndë organike të bimëve të tjera jo vajore, jo më shumë se	1
Lëndë minerale, jo më shumë se	1
Kokrra të thata jo më shumë se	2

BIME MJEKËSORE Kokërr dëllinjë e zezë 7 mm	Fructus Juniperi communis 7 mm Juniperus communis L.f Cupressaceae
--	---

Kërkesat cilësore

Treguesit organo-shqisorë

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Kokrra të ndritshme me diametër mbi 7 mm, të tulta, përsipër kanë një brazdë me tri rreze, në rrënjë gjenden gjurmat e bishtit. Era karakteristike aromatike, shije djegëse dhe e ëmbël.
Ngjyra	Blu e errët ose violet e thellë. Nuk lejohen kokrra të mykura, të kalbura, dëmtues dhe ekstreme të kafshësh.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Lagështira, jo më shumë se	16
Hiri i përgjithshëm, jo më shumë se	4
Kokrra me ngjyrë jo normale, të papjekura dhe të dëmtuara, jo më shumë se	2
Përzierje minerale, jo më shumë se	0.5
Kokrra me diametër nën 7 mm jo më shumë se	5
Lëndë organike të vetë bimës, jo më shumë se	0.5
Vajra eterik, jo më pak se	1

BIME MJEKESORE Frutë gjembaçi	Fructus silybi Sylibum marianum GAERTN L. Copmosiate
---	---

Kërkesat cilësore

Treguesit organo-shqisorë

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Kokrra të thata, të pastra, të plota dhe pjesërisht të copëtuara me madhësi të ndryshme. Aroma dhe shija karakteristike të vetë bimës.
Ngjyra	Nga jashtë kafe, kafe e errët. Nuk lejohen të nxira, të mykura, të kalbura dhe papastërti të tjera.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Lagështira, jo më shumë se	14
Kokrra me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	4
Lëndë organike të vetë bimës, jo më shumë se	1
Kokrra që bien në sitën me diametër 2 mm, jo më shumë se	2
Lëndë minerale, jo më shumë se	0.5

BIME MJEKËSORE Frut glikanze	Fructus foeniculi Foeniculum vulgare MILL f. Umbelliferae
--	--

Kërkesat cilësore*Treguesit organo-shqisorë*

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Fara të thata, të zhvilluara me pjekuri të plotë, me dimensione të ndryshme, në formë ovale, me aromë dhe shije karakteristike të vetë bimës. Sipërfaqja e arës e ashpër jo e lëmuar.
Ngjyra	E gjelbër në kafe ose e gjelbër në të verdhë. Nuk lejohen të nxira, të mykura, të kalbura dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Lagështira, jo më shumë se	12
Fara me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	3
Përmbajtja në vaj eterik	3-4
Lëndë organike të vetë bimës, jo më shumë se	1
Lëndë minerale, jo më shumë se	1
Farë të papjekura (paformuara, bosh), jo më shumë se	1

BIME MJEKESORE Frut kërkute	Fructus Ammi visnagae Ammi visnaga (L) LAM f. umbelliferae
---------------------------------------	---

Kërkesat cilësore*Treguesit organo-shqisorë*

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Farëra të plota, pa bishta, të shoshura, me pjekje të plotë dhe të thata, me kanale ose viza për së gjati.
Ngjyra	E verdhë në krem deri në gri të errët. Nuk lejohen fara të nxira, të mykura, të kalbura, të kimbura dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Lagështira, jo më shumë se	12
Farëra me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	3
Lëndë organike të vetë bimës dhe lëndë të huaja të tjera, jo më shumë se	1
Lëndë minerale, jo më shumë se	0.5

BIME MJEKESORE Frut konopice ose mrine	Fructus Agni- casti Vitex Agnus –castus L.f verbenaceae
--	--

Kërkesat cilësore*Treguesit organo-shqisore*

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Farëra të thata, të plota, të pastra, duke mbajtur shenjën ose mbeturinën e kupës, pa aromë e shije.
Ngjyra	Nga jashtë gri në kafe e çelur dhe kafe në të verdhë, nga brenda krem në të verdhë. Nuk lejohen të nxira, të mykura, të kalbura dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Lagështira, jo më shumë se	13
Kokrra me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	3
Lëndë organike të vetë bimës, jo më shumë se	1
Farëra që bien nën sitën me diametër 3 mm, jo më shumë se	2
Lëndë minerale, jo më shumë se	0.5

<p>BIME MJEKESORE Mollë të egra të grira të thara</p>	<p>Frutus Pyri mali Malus sylvestris MILL L. Rosaceae</p>
--	---

Kërkesat cilësore

Treguesit organo-shqisore

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Kokrra të pjekura, të prera në rrishta të thata, të prera në formë ovale ose si thela me trashësi 2-4 mm, aroma e lehtë e kokrrës me shije të thartë dhe rrudhëse.
Ngjyra	Cipa e verdhë në të kuqe, tuli i verdhë në portokalli. Nuk lejohen të nxira, të mykura, të kalbura dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
1. Lagështira, jo më shumë se	14
2. Rrishta me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	2
3. Rrishta me trashësi mbi 4-8 mm, jo më shumë se	10
4. Lëndë organike të vetë bimës, jo më shumë se	1
5. Lëndë minerale, jo më shumë se	0.1

BIME MJEKESORE Frut drize	Fryctus Spinae –chisti Paliurus aculeatus LAM (sin. Palirurus spina- Christi MILL) f. Rhamnaceae
-------------------------------------	---

Kërkesat cilësore

Treguesit organo-shqisore

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Fruta të pjekura, pa bishta, me dimensione të ndryshme me farë në qendër, me shije pak të ëmbël.
Ngjyra	Nga jashtë fruti ka ngjyrë të verdhë në rozë e kafe, nga brenda ngjyrë të bardhë ose bezhë e çelët. Nuk lejohen të nxira, të mykura, të kalbura dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Lagështira, jo më shumë se	13
Fruta me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	3
Lëndë organike të vetë bimës, jo më shumë se	1
Lëndë minerale, jo më shumë se	0.5

BIME MJEKESORE Kokërr (Farë) gështenjë e egër	Semen Hippocastani Aesculu Hippocastanum L.F Hippocastanaceae
---	--

Kërkesat cilësore*Treguesit organo-shqisore*

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Kokrra të shëndosha, të pjekura, të thata, të pastra nga gëzhoja me madhësi të ndryshme nga gështenja e butë. Pa erë, shije të ëmbël në të hidhur.
Ngjyra	Kokrra nga jashtë ngjyrë kafe origjinale të gështenjës, nga brenda e bardhë në krem. Nuk lejohen, kokrra të kalbura, të nxira, dëmtues dhe ekstreme të kafshësh.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Lagështira, jo më shumë se	13
Kokrra me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	2
Lëndë organike të vetë bimës, jo më shumë se	0.5
Kokrra të mykura, jo më shumë se	3
Lëndë minerale, jo më shumë se	0.5

BIME MJEKESORE Farë sinap i bardhë	Semen Sinapis albae Sinapis alba L.F. cruciferae
--	---

Kërkesat cilësore*Treguesit organo-shqisore*

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Fra të thatë, të pastra, të plota, me dimatër rreth 2 mm. Pa aromë, me shije në fillim sit e vajit me vonë djegëse, e ndijshme e theksuar në hunde.
Ngjyra	Nga jashtë krem në të verdhë ose e bardhë në kafe. Nga brenda e gjelbër në të verdhë. Nuk lejohen të mykura, të kalbura dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Lagështira, jo më shumë se	12
Farëra të huaja dhe të coptuara, jo më shumë se	2
Farëra me ngjyrë jonormale, jo më shumë se	3
Lëndë organike të vetë bimës, jo më shumë se	0.25
Fara të vyshkura të paformuara, jo më shumë se	0.25
Lëndë minerale, jo më shumë se	3
Përmbajtja në hi, jo më shumë se	3
Përmbajtja në vaj eterik	0.3-1.3

BIME MJEKESORE Farë sinap i zi	Semen Sinapis nigrae Brassica nigra L.F. cruciferae
--	--

Kërkesat cilësore*Treguesit organo-shqisore*

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Fara të thatë, të pastra, të plota, me dimatër rreth 2 mm. Pa aromë, me shije në fillim si të vajit më vonë e rëndë, djegëse, e ndijshme e theksuar në hundë.
Ngjyra	Nga jashtë vishjne e errët deri në kafë. Nga brenda e gjelbër në të verdhë. Nuk lejohen farëra të mykura, të kalbura dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Lagështira, jo më shumë se	12
Farëra të huaja dhe të coptuara, jo më shumë se	2
Farëra me ngjyrë jonormale, jo më shumë se	3
Lëndë organike të vetë bimës, jo më shumë se	0.25
Fara të vyshkura të paformuara, jo më shumë se	0.25
Përmbajtja në vaj eterik, jo me pak se	0.7
Lëndë minerale jo më shumë se	0.5
Përmbajtja në hi, jo më shumë se	5

BIME MJEKESORE Farë xhirokulli	Semen Colchici Colchicum autumnale L.F. Liliaceae
--	--

Kërkesat cilësore*Treguesit organo-shqisurë*

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Fara të thatë, të pastra, të padeformuara me madhësi 1.5-2.5 mm, pa aromë dhe shije helmuese, shumë të forta dhe të pa shtypshme.
Ngjyra	Nga jashtë kafe e çelët, kafe e errët, nga ana e brendëshme me krem të çelur. Nuk lejohen faratë mykura, të kalbura dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Lagështira, jo më shumë se	10
Farëra me ngjyrë jonormale, jo më shumë se	2
Përmbajtja në alkaloidë	0.3-0.6
Fara që bien në sitën me diametër 1.5 mm, jo më shumë se	3
Lëndë minerale jo më shumë se	0.3

BIME MJEKESORE Farë sinapi i kuq	Semen sinapis ose Brassica Rose
--	--

Kërkesat cilësore

Treguesit organo-shqisorë

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Farëra të thata, të plota, me dimatër 1-2 mm, të pastra nga copat e bishtajave, pa aromë dhe me shije djegëse të theksuar në gjuhë.
Ngjyra	E kuqe e mbyllur në kafë. Nuk lejohen të mykura, të kalbura dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Lagështira, jo më shumë se	10
Përmbajtja në hi, jo më shumë se	5
Farëra të tjera të huaja, të copëtuara, jo më shumë se	2
Farëra me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	3
Lëndë organike të vetë bimës jo më shumë se	0.25
Lëndë minerale, jo më shumë se	0.5
Përmbajtja në vaj eterik, jo më pak se	0.6

BIME ETEROVAJORE Farë korenadri	Fructus coriandri Coriandrum sativum L. f. Umbelliferrae
--	---

Kërkesat cilësore

Treguesit organo-shqisore

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Fara të thata, të pastra, të plota, me diamensionë të ndryshme, të rrullbullakta, të forta. Me aromë dhe shije karakteristike të vetë bimës.
Ngjyra	E verdhë dhe kafe e çelur. Nuk lejohen, farëra të mykura, të nxira, të kalbura dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Lagështira, jo më shumë se	14
Përmbajtja në vaj (oleum coreandre), jo më shumë se	0.6-0.8
Lëndë minerale, në pluhur, jo më shumë se	0.5
Farëra me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	2
Përmbajtja në hi, jo më shumë se	7
Lëndë të huaja të vetë bimës, jo më shumë e	1

BIME MJEKESORE Lëvore kokërr arrë	Cortex Juglandis nucum Juglans regia L.f Juglandaceae
---	--

Kërkesat cilësore

Treguesit organo-shqisore

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Lëvore të thata, ndarë në kokrra në copa me madhësi të ndryshme të cilat mund të kenë dhe bishtin e tyre natyral me aromë karakteristike të vetë arrës.
Ngjyra	Nga jashtë jeshile në të errët dhe jeshile të çelur me nuançë të verdha, ndërsa nga brenda kafe të errët. Nuk lejohen të mykyra, të nxira, dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Lagështira, jo më shumë se	12
Lëndë organike të vetë bimës ose të bimëve të tjera, jo më shumë se	2
Lëvore të prekura nga insektet ose me njolla të kuqe, kafe jo më shumë se	3
Lëndë minerale jo më shumë se	1.5

BIME MJEKESORE Lëvore arrci (drunakuq)	Cortex Rhammi falacis Rhamnus fallax BOISS f. Rhamnaceae
---	---

Kërkesat cilësore

Treguesit organo-shqisore

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Lëvore të të prera dhe të çara 2-3 pjesësh të paraqiten të përdredhura me gjatësi 6-14 cm, të hequra nga filizat e drurit që kanë trashësinë e gishtit. Me aromë të vetë bimës.
Ngjyra	Ne pjesën e jashtme e murrme në të gjelbër me pika grixho, në pjesën e brendëshme e verdhë në të kuqe dhe në kafe. Nuk lejohen të nxira, të mykura, të kalbura dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Lagështira, jo më shumë se	14
Përmbajtja në hi, jo më shumë se	8
Lëvore me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	3
Lëvore nga lloje të tjera druresh, jo më shumë se	2
Pjesë të coptuara të lëkurës nën 6 cm gjatësi, jo më shumë se se	5
Lëvore të prekura nga insektet jo karantinore, jo më shumë se	0.5
Lëndë mirë rale, jo më shumë se	0.5

BIME MJEKESORE Lëvore fasulesh të bardha	Fructus phaseoli sine semine Phasolus vulgaris L.f Leguminosae
---	---

Kërkesat cilësore*Treguesit organo-shqisore*

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Lëvoret e qëruara nga kokrrat, me bishtin e tyre natyral, të plota dhe pjesërisht të thyera të painfektuara, pa pika të zeza e ndryshk.
Ngjyra	Lëvoret nga jashtë të bardha në krem disa pika të rralla bojë kafe në sipërfaqe, nga brenda ngjyrë e bardhë me një cipë të hollë si të qepës. Nuk lejohen të nxira dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Lagështira, jo më shumë se	10
Lëvore me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	3
Lëvore me ngjyrë rozë të çelur dhe të prekura në 1/10 e lëvores, jo më shumë	15
Lëndë organike të vetë bimës ose të bimëve të tjera, jo më shumë se	1
Lëvore të prekura nga insektet jo karantinore, jo më shumë se	2
Lëndë mirerale, jo më shumë se	0.5

<p>BIME MJEKËSORE Lëvore kokërr gështenjë e egër</p>	<p>Pericarpium Hippocastani Aesculus hippocastanum L.f Hippocastanaceae</p>
---	--

Kërkesat cilësore*Treguesit organo-shqisorë*

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Të thata të pjekura mirë, të zhveshura me dorë nga kokrrat e gështenjës ose të mbledhura për dhe në kondita normale me gjembat për rreth në formë shpuese, të plota dhe pjesërisht të copëtuara, pa aromë dhe pa shije.
Ngjyra	Bojë kafe e çelur, nuancë të verdha dhe deri kafe pak me të thelle për brenda. Nuk lejohen të mykura, të kalbura, të nxira, të përziera me baltë dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Lagështira, jo më shumë se	12
Lëndë organike të vetë bimës ose të bimëve të tjera të pyllit, jo më shumë se	2
Lëvore me ngjyrë jo normale, por pa lagështirë të tepërt, jo më shumë se	4
Lëndë minerale, jo më shumë se	1.5

BIME MJEKESORE Lëvore nerënxe	Pericarpium Aurantii amari Citrus aurantium L. ssp. amara ENGLER f. Rutaceae
---	---

Kërkesat cilësore

Treguesit organo-shqisorë

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Lëvore të thata, të prera në thela eliptike, të qëruara mirë nga pjesa e brendëshme (tuli), aromë e këndëshme e vetë bimës, shija e hidhur dhe djegëse.
Ngjyra	Pjesa e jashtëme ngjyrë karakteristike portokalli e theksuar, brenda e bardhë në krem. Nuk lejohen lëvore të kalbura, të nxira, të mykura, të prekura nga insektet sidomos breshkëza e agrumeve dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Lagështira, jo më shumë se	13
Lëvore me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	3
Lëndë të huaja të vetë bimës, jo më shumë se	1
Lëvore në forma të ndryshme, jo më shumë se	10
Lëvore të prekura pjesërisht nga sëmundjet e ndryshme, jo më shumë se	5

BIME MJEKESORE Lëvore portokalli	Pericarpium Aurantii dulcis Citrus sinensis (L) OSBECK f. Rutaceae
--	---

Kërkesat cilësore*Treguesit organo-shqisore*

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Të prera në formë thelash eliptike dhe forma të ndryshme të thata dhe të pastuara mirë nga pjesët e brendëshme të frutit (tulit), aroma e këndëshme e vetë bimës dhe shija e ëmbël karakteristike djegëse.
Ngjyra	Pjesa e jashtëme ngjyrë karakteristike e portokalles nga brenda e bardhë. Nuk lejohen të kalbura, të mykura, të nxira, të prekura krejtësisht nga insektet sidomos nga breshkëza e agrumeve dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Lagështira, jo më shumë se	13
Lëvore me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	3
Lëndë të huaja të vetë bimës, jo më shumë se	1
Lëvore të prekura pjesërisht nga sëmundjet e ndryshme, jo më shumë se	8

BIME MJEKESORE Lëvore dushku	Cortex Quercus Quercus robur L. (sin. Q. pedunculata EHRH) Quercus petraea (MATT) LIEB (sin Q. Sessiliflora SALIS) F. Fagaceae
--	---

Kërkesat cilësore

Treguesit organo-shqisore

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Lëvoret të prera dhe të çara në 2-3 pjesë, të paraqiten të pa drunjezuara, pa plasaritje, të lëmuara me gjatësi 5-15 cm, të hequra nga degët, me aromë karakteristike të vetë bimës.
Ngjyra	Ne pjesën e jashtëme e gjelbër në të murrme, në pjesën e brendëshme krem në kafe të çelët. Nuk lejohen të nxira, të mykura, të kalbura dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Lagështira, jo më shumë se	14
Lëvore me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	3
Lëvore druësh të tjerë, jo më shumë se	2
Pjesë të coptuara të lëvores me gjatësi nën 5 cm, jo më shumë se se	3
Të prekura nga insektet jo karantinore, jo më shumë se	0.5
Lëndë minerale, jo më shumë se	0.5

BIME MJEKËSORE Lëvore e Farës gështenjës egër	Cortex Hippocastani e Semina Aesculus hippocastannum L.f Hippocastanaceae
--	--

Kërkesat cilësore

Treguesit organo-shqisorë

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Përbëhet nga pjesë të cipës mbuluese të farës të cilat kane paraqitjen e copave të brishta, të perkulura nga jashtë, janë të lëmuara, kurse nga brenda të ashpra, të rrudhura pa push në disa prej tyre. Me shije rrudhese të lehtë dhe pa erë.
Ngjyra	Copat e cipës se farës kanë ngjyrë kafe të errët nga jashtë dhe kafe të çelur nga brenda, nganjëherë në sipërfaqen e jashtëme vërehet një zonë me ngjyrë bezhë deri kafe të çelur. Nuk lejohen pjesë të nxira, të mykura, nga brenda.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Lagështira, jo më shumë se	17
Cipa me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	5
Hiri i përgjithshëm, jo më shumë se	3
Përqindja e tanineve, jo më pak se	3.5

BIME MJEKESORE Lëvore shegë e egër	Pericarpium granati Punica granatum L. f. Punicaceae
--	---

Kërkesat cilësore*Treguesit organo-shqisore*

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Lëvore të thata, të veçuara nga bërthamat e shegës, të ndara në 2-5 copa të formave të ndryshme. Aroma karakteristike e shegës.
Ngjyra	Nga faqja e jashtëme, ngjyrë kafe, kafe e çelur deri në të errët. Nga faqja e brendëshme në krem, kafe e çelur. Nuk lejohen, të mykura, të nxira, të kalbura dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Lagështira, jo më shumë se	11
Lëndë organike të vetë bimës dhe bimëve të tjera, jo me pak se	3
Lëvore të prekura nga insektet ose njolla të kuqe, kafe, jo më shumë se	4
Lëndë minerale në pluhur, jo më shumë se	2

BIME MJEKËSORE Bishta vishnje dhe qershie	Stipites cerasorum Prunus cerasus L. dhe Prunus avium L.f Rosaceae
---	---

Kërkesat cilësore

Treguesit organo-shqisore

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Bishta të qershive të llojeve të ndryshme (dhe vishnjeve) të thata dhe të pastruara, nga farat dhe fletët, të bashkuara në veshull ose të veçuara.
Ngjyra	Jeshile të çelur, jeshile të errët dhe kafe të hapet. Nuk lejohen bishta të vishnjeve dhe qershive të egra dhe papastërti të ndryshme si bërthama, tul të frutit, fletë etj.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Lagështira, jo më shumë se	10
Lëndë organike të vetë bimës ose të bimëve të tjera, jo më shumë se	2
Bishta me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	2
Lëndë minerale, jo më shumë se	0.5

BIME MJEKESORE Sythe (Burbuqe) pishë	Gemmae Pini Pinus silvestris f. Pinaceae
--	---

Kërkesat cilësore

Treguesit organo-shqisore

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Sythat (burbuqet) e pishës të cilat mblidhen nga të gjitha llojet e pishave, të jenë të thata, të pastërta, nga degët dhe me aromë të këndëshme.
Ngjyra	E verdhë, kafe e çelët deri në të errët

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Lagështira, jo më shumë se	13
Lëndë organike të vetë bimës, jo më shumë se	2
Lëndë minerale, jo më shumë se	1

BIME MJEKESORE Myshk dushku	Lichen Quercus (Evernia prunastri)
---------------------------------------	---

Kërkesat cilësore*Treguesit organo-shqisorë*

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Mushk i butë në gjendje të thatë, në forma tufe dhe pjesërisht të shkoqura duke mbajtur shenjën e bishtit si në formë thoi të grumbulluara nga pemë të reja, me aromë të lehtë të këndëshme të vetë bimës.
Ngjyra	Gri me nuancë të lehta jeshile të çelur. Nuk lejohen të nxira, të mykura, të kalbura dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Lagështira, jo më shumë se	10
Myshk me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	3
Myshk nga lloje të tjera dhe pjesë të lëvores së drurit, jo më shumë se	3
Lëndë minerale, jo më shumë se	0.5

BIME MJEKESORE Myshk pishë	Lichen Pini
--------------------------------------	--------------------

Kërkesat cilësore

Treguesit organo-shqisorë

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Myshk i butë në gjendje të thatë, në formë tufe dhe pjesërisht të shkoqura të grumbulluara nga pisha të njoma me aromë të vetë bimës.
Ngjyra	Jeshile gri e errët. Nuk lejohen të nxira, të mykura, të kalbura dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Lagështira, jo më shumë se	10
Myshk me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	3
Myshk nga lloje të tjera dhe pjesë të lëvoreve të drurit, jo më shumë se	3
Lëndë minerale, jo më shumë se	0.5

BIME MJEKESORE Myshk ahu	Lichen fagi Pagus silvation l.f. fagaceae
------------------------------------	--

Kërkesat cilësore*Treguesit organo-shqisore*

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Myshk i butë në gjendje të thatë, në formë tufe të vogël, pjesërisht të shkëputur dhe të shkoqur, që mblidhet nga ahu.
Ngjyra	Ngjyrë gri, gri e errët, hiri e hapur, jeshile e çelët deri në të murrme, veçanërisht në anën tjetër të myshkut.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Lagështira, jo më shumë se	13
Myshqe të llojeve të tjera dhe pjesë druri, jo më shumë se	3
Lëndë minerale, jo më shumë se	0.5

BIME MJEKESORE Myshk shkoze	Lichen carpini
---------------------------------------	-----------------------

Kërkesat cilësore

Treguesit organo-shqisore

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Myshk në gjendje të thatë, në formë tufe të vogël, pjesërisht të shkëputur dhe të shkoqur, që mblidhet nga shkoza.
Ngjyra	Ngjyrë hiri e çelët deri në të errët, jeshile në gri me nuancë ngjyrë kafe.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Lagështira, jo më shumë se	13
Myshqe të llojeve të tjera dhe pjesë druri, jo më shumë se	3
Lëndë minerale, jo më shumë se	0.5

BIME MJEKESORE Mustaqe misri	Stigmata Maydis Zea mays L.f. graminaceae
--	--

Kërkesat cilësore*Treguesit organo-shqisore*

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Mustaqe misri të thata, të pastërta, të zhvilluara, fije të holla me dimensione të ndryshme. Pa aromë e shije.
Ngjyra	Krem, të verdhë e kuqe, në të verdhë, e verdhë në karamel deri në të murrme të errët. Nuk lejohen të mykura, të kalbura, të nxira, të djegura dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Lagështira, jo më shumë se	10
Pjesë të ngjitura, të dëmtuara, të përzhitura të pjesës së jashtme të kallirit dhe me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	5
Lëndë organike të vetë bimës, jo më shumë se	1
Lëndë minerale, jo më shumë se	0.5

BIME MJEKESORE Tubere (zhardhok) salepi Specie të gjinise Orchis L.	Anacamptis pyramidalis RICH e platnathara bifolia RICH f. Orchidaceae
---	--

Kërkesat cilësore*Treguesit organo-shqisore*

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Tubera të plota, të thatë, në formë gishterinjsh, dhe forma të tjera, konsistenca e thatë miellore. Aroma dhe shija karakteristike e vetë bimës.
Ngjyra	Nga jashtë ngjyrë e murrme me nuancë të verdhë nga brenda e bardhë në krem. Nuk lejohen tubera të nxirë, të mykura, të kalbura, të pa lara mirë nga balta, të vjetra pa konsistencë miellore, lëndë organike të ndryshme dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Lagështira, jo më shumë se	10
Tubera të copëtura, të thyera, jo më shumë se	3
Tubera të llojeve jo gishtore, jo më shumë se	3
Lëndë minerale, jo më shumë se	0.5

BIME MJEKESORE Rrënjë aguliçe	Rhizome Primulae Primula veris L.f Primulaceae
--	---

Kërkesat cilësore

Treguesit organo-shqisorë

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Rrënjë të thata, të zhvilluara, të pastruara nga pjesa e mbitokës, të paprekura nga insektet, me madhësi të ndryshme, të lara nga dherat, pa aromë dhe pa shije.
Ngjyra	Lëvorja e verdhë në kafe dhe në të kuqerremte nga brenda e bardhë në krem. Nuk lejohen të nxira, të mykura, të kalbura dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Lagështira, jo më shumë se	12
Rrënjë me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	3
Rrënjë të prekura nga insektet jo karantinore, jo më shumë se	2
Rrënjë me pjesë mbi tokësore, jo më shumë se	2
Rrënjë të llojit primula vulgaris, jo më shumë se	5
Lëndë minerale, jo më shumë se	1

BIME MJEKESORE Rrënjë çikore	Radix Cichorii Chichorium intybus L.f Compositae
--	---

Kërkesat cilësore*Treguesit organo-shqisore*

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Rrënjë të zhvilluara, të thata, të pastruara nga pjesa mbitokësore dhe fibrat e holla anësore, me gjatësi të ndryshme dhe me trashësi me dimatër jo me të hollë se 1 cm, pa aromë dhe me shije të hidhur.
Ngjyra	Ne pjesën e jashtëme e murrme në të verdhë, nga brenda e bardhë në krem. Nuk lejohen të mykura, të nxira, të kalbura, rrënjë të bimëve helmuese dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Lagështira, jo më shumë se	12
Rrënjë me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	3
Rrënjë të prekura nga insekte karantinore, jo më shumë se	2
Rrënjë me pjesë mbitokësore dhe rrënjë të holla, jo më pak se	3
Rrënjë të llojeve të tjera por jo helmuese, jo më shumë se	0.5
Lëndë minerale, jo më shumë se	1

BIME MJEKËSORE Rrënjë fieri mashkull	Rhizome Filicis maris Dryopteris filix mas SCHOTT f. Polypodiaceae
--	---

Kërkesat cilësore*Treguesit organo-shqisore*

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Rrënjë të thata me gjatësi të ndryshme nga 7 cm e lart, rizoma në pjesën e jashtëme do të jete e mbuluar me mbeturinat e degëve dhe rrënjëve të holla, fibrat dhe bazat e gjetheve do të jenë të gjata, jo më shumë se 3 cm. Rizomat të jenë të prera (krasitura deri sa të dalë pjesa jeshile).
Ngjyra	Nga jashtë kafe e mbyllur, ndërsa nga brenda me ngjyrë jeshile në të verdhë dhe jeshile me nuancë të murrme. Nuk lejohen rrënjë të mykura, të kalbura, të nxira dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Lagështira, jo më shumë se	13
Rizoma me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	4
Pjesë të vetë bimës ose bimëve të tjera, jo më shumë se	3
Rrënjë të pakrasitura mirë ose krejtësisht të pakrasitura, jo më pak se	5
Lëndë minerale, jo më shumë se	3

BIME MJEKESORE Rrënjë grami pa fijeza	Rhizoma Cynodontis sine radice Cynodon dactylon PERS f. Graminaceae
--	--

Kërkesat cilësore*Treguesit organo-shqisore*

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Rizoma të thata, të zhvilluara, të pastruara nga fibrat dhe fletët, të prera në copa nga 10-15 cm gjatësi, pa erë, me shije pak si të ëmbël.
Ngjyra	E bardhë në krem të verdhë me nyje kafe dhe brenda e bardhë. Nuk lejohen të mykura, të kalbura, të nxira dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Lagështira, jo më shumë se	12
Rizome me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	3
Rizome të llojit talle e të tjera, jo më shumë se	3
Rrënjë me fijeza pjesërisht të paprera ose mbeturinat e luspave, jo më pak se	5
Lëndë minerale, jo më shumë se	1

BIME MJEKESORE Rrënjë e gentit (e sanzit)	Gentian lutea L.f Gentianaceae
---	---

Kërkesat cilësore*Treguesit organo-shqisorë*

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Rrënjë të grumbulluara në muajt gusht-shkurt, të thata, me gjatësi 10-15 cm, të pastruara nga pjesët e mbi tokës dhe rrënjët e holla me trashësi deri në 1 cm dhe të pangrëna nga insektet, të çara, në dy ose në katër pjesë. Me aromë karakteristike të vetë bimës.
Ngjyra	E verdhë deri në kafe, e verdhë e errët deri në kafe të çelur. Nuk lejohen rrënjë të nxira, të mykura, të kalbura dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Lagështira, jo më shumë se	12
Rrënjë me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	5
Rrënjë të prekura, nga insektet ko karantinore, jo më shumë se	3
Lëndë minerale, jo më shumë se	1
Ekstrakt i lëngshëm, jo më shumë se	33

BIME MJEKESORE Rrënjë gjuhë nuse	Radix Ononidis Ononis spinosa L.f Leguminosae
--	--

Kërkesat cilësore*Treguesit organo-shqisore*

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Rrënjë të zhvilluara, të thata, me lëvore të padëmtuar, të pastruara nga kokat (qafa) e rrënjës, dherat, rrënjët e dëmtuara nga insektet, nga rrënjët e holla nën 5 mm. Rrënjët priten me thike 10-15 cm gjatësi, rrënjët e trasha çahan në dysh.
Ngjyra	Nga jashtë kafe në gri, në pjesën e brendëshme e bardhë në krem në të verdhë. Nuk lejohen rrënjë të nxira, të mykura, të kalbura dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Lagështira, jo më shumë se	12
Rrënjë me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	2
Pjesë të vetë bimës ose bimëve të tjera, jo më shumë se	1
Rrënjë me gjatësi të ndryshme (+ ose – nga e caktuara), jo më shumë se	8
Lëndë minerale, jo më shumë se	1

BIME MJEKËSORE Rrënjë helmarine	Radix Belladonnae Atropa belladonna L.f Solanaceae
---	---

Kërkesat cilësore*Treguesit organo-shqisorë*

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Rrënjë të zhvilluara, të plota, jo porozë, të thata, të pastra nga pjesët e mbitokës (kokat e rrënjëve) nga fibrat e holla, nga të kalbura, të ngrëna nga insektet, të prera se gjati në dysh ose katër pjesë me gjatësi 10-15 cm dhe trashësi 1 cm.
Ngjyra	Rrënja nga jashtë kafe në të verdhë dhe nga brenda e bardhë në gri. Nuk lejohen rrënjë të kalbura, të mykura, të nxira dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Lagështira, jo më shumë se	13
Rrënjë pa ngjyrë normale, jo më shumë se	4
Rrënjë të prekura, nga insektet dhe me pjesët e mbitokës jo më shumë se	4
Lëndë organike të vetë bimës ose bimëve të tjera jo më shumë se	2
Rrënjë porozë, jo më shumë se	10
Rrënjë me gjatësi të ndryshme nën 10 cm ose mbi 15 cm, jo më shumë se	8
Lëndë minerale, jo më shumë se	2

BIME MJEKESORE Rrënjë hithri	Radix (rhizome) Urticae Urtica dioica L.f Urticaceae
--	---

Kërkesat cilësore*Treguesit organo-shqisore*

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Rrënjë të zhvilluara, të thata, të pastruara nga pjesa e mbitokës nga trangu dhe nga rrënjët e nga fibrat e holla, të formës leshtore, rrënjë të prera 15-20 cm të gjata. Pa aromë e me shije, pak të hidhur.
Ngjyra	Ne pjesën e jashtëme të murrme, si e mbyllur në të verdhë, nga brenda e bardhë në krem. Nuk lejohen rrënjë të nxira, të mykura, të kalbura, rrënjë të bimeve të tjera helmuese dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Lagështira, jo më shumë se	12
Rrënjë me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	3
Rrënjë të prekura, nga insekte jo karantinore, jo më shumë se	2
Rrënjë me pjesë të mbitokës e fibra, jo më shumë se	3
Rrënjë të bimëve të tjera por jo helmuese, jo më shumë se	0.5
Lëndë minerale, jo më shumë se	1

BIME MJEKËSORE Rrënjë mellage e bardhë e qëruar	Radix Althaeae mundata Althaea officinalis L.f Malvaceae
--	---

Kërkesat cilësore*Treguesit organo-shqisorë*

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Rrënjë të thata, të zhvilluara, të plota, të qëruara, nga lëkura nga rrënjët e holla, pjesët e mbitokës, rrënjët e trasha të çahan në pjesë të holla në formë 4 këndëshe me 0.5-0.7 mm, me gjatësi të ndryshme, pa aromë e shije muliloze.
Ngjyra	E bardhë, e bardhë në krem të verdhë. Nuk lejohen rrënjë të nxira, të mykura, të kalbura dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Lagështira, jo më shumë se	12
Rrënjë që përmbajnë pjesë lëkurë me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	3
Rrënjë të dhëmbëzuara jo më shumë se	3
Lëndë organike të tjera të vetë bimës, jo më shumë se	0.5
Rrënjë me dimensione të ndryshme (+ ose-) nga normalja, jo më shumë se	6
Lëndë minerale, jo më shumë se	0.5

BIME MJEKËSORE Rrënjë qumeshtore	Radix Taraxaci Taraxacum officinale WEB f. Compositae
--	--

Kërkesat cilësore*Treguesit organo-shqisore*

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Rrënjë të thata, të zhvilluara, të plota, të pastruara nga mbeturinat e fletëve. Rrënjët nuk priten e as çahan sepse kullon qumeshti. Pa aromë dhe me shije karakteristik të vetë bimës.
Ngjyra	Kafe në të kuqe, e bardhë në qendër (palca) e verdhë. Nuk lejohen rrënjë të nxira, të mykura, të kalbura dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Lagështira, jo më shumë se	14
Rrënjë me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	3
Rrënjë të prekura nga insektet jo karantinore, jo më shumë se	4
Lëndë organike të tjera të vetë bimës, jo më shumë se	3
Lëndë minerale, jo më shumë se	0.5
Përmbajtja në hi, jo më shumë se	10

BIME MJEKESORE Rrënjë shperndre	Radix Ebuli Sambucus ebulus L.f Caprifoliaceae
---	---

Kërkesat cilësore*Treguesit organo-shqisore*

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Rrënjë të thata, të zhvilluara, me gjatësi 10-12 cm dhe me trashësi të ndryshme, të pastruara nga fibrat, pjesët e mbi tokës ose kokat e rrënjëve, rrënjët nga brenda të jenëbosh, e rrënjët e trasha mund të çahan dysh.
Ngjyra	Nga jashtë kafe e errët e kafe e çelur, kurse nga brenda krem deri në të verdhë. Nuk lejohen rrënjë të nxira, të mykura, të kalbura dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Lagështira, jo më shumë se	12
Lëndë organike të tjera të vetë bimës, jo më shumë se	2
Rrënjë me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	3
Rrënjë të prekura nga insektet jo karantinore, jo më shumë se	2
Lëndë minerale, jo më shumë se	1
Përmbajtja në hi, jo më shumë se	8

BIME MJEKESORE Rrënjë rrodhe e madhe	Radix Bardanae Arentium lappa L.f compositatae
--	---

Kërkesat cilësore*Treguesit organo-shqisore*

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Rrënjë të zhvilluara, jo porozë, të thata, të pastruara nga fibrat (rrënjët e holla) dhe pjesët e mbitokës (kokat e rrënjëve) me gjatësi 10-12 cm dhe me trashësi të ndryshme. Rrënjët e trashatë çahan në 2 ose 4 pjesë.
Ngjyra	Nga jashtë kafe e errët deri në kafe e çelur, kurse nga brenda e bardhë në krem të hirtë. Nuk lejohen rrënjë të nxira, të mykura, të kalbura dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Lagështira, jo më shumë se	14
Lëndë organike të vetë bimës ose të bimëve të tjera jo helmuese, jo më shumë se	2
Rrënjë me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	3
Rrënjë të prekura nga insektet jo karantinore, jo më shumë se	3
Rrënjë porozë dhe të vjetra, jo më shumë se	5
Lëndë minerale, jo më shumë se	1

BIME MJEKESORE Rrënjë shpatore e qëruar	Rhizome iridis mudatum Iris florentina L. Iris pallid LAM dhe Iris germanica L.f Iridaceae
---	---

Kërkesat cilësore*Treguesit organo-shqisore*

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Rrënjë të grumbulluara në muajt korrik-tetor, të thata, të qëruara nga lëvorja dhe rrënjët e holla dhe nga pjesët e mbi tokës. Rizomat e trasha të çahan në 2 ose 4 pjesë, me dimensione, gjatësia 5-10 cm, në rizomat e qëruara dallohen rrënjët e holla, të pangrëna nga insektet.
Ngjyra	Të bardha, të bardha në krem e në të verdhë. Nuk lejohen rrënjë të nxira, të mykura, të kalbura, të prekura nga insektet dhe çdo lloji papastërie tjetër.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Lagështira, jo më shumë se	12
Rrënjë me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	2
Rrënjë me dimensione nën 5 cm, jo më shumë se	5
Lëndë minerale, jo më shumë se	0.25

BIME MJEKËSORE Rrënjë shpatore e paqëruar	Rhizome iridis natural Iris florentina L Iris pallid LAM dhe Iris germanica L.f Iridaceae
---	--

Kërkesat cilësore

Treguesit organo-shqisore

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Rhizome të thata, të grumbuluara nga korriku deri në tetor, të paqëruara, të pastruara nga pjesët e mbi tokës dhe nga rrënjë të holla, rizomat e trasha të çara me dysh ose 4, me dimensione 5-10 cm gjatësi, pa aromë dhe të mos jenë të ngrëna nga insektet.
Ngjyra	Rrënjët nga jashtë të verdha deri në kafe, ndërsa nga brenda e bardhë krem në të verdhë. Nuk lejohen rizome të nxira, të mykura, të kalbura, dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Lagështira, jo më shumë se	12
Rrënjë me dimensione nën 2 cm, jo më shumë se	5
Rrënjë të prekura nga insektet jo më shumë se	3
Rrënjë me ngjyrë jonormale, jo më shumë se	5
Lëndë minerale, jo më shumë se	1

BIME MJEKËSORE Rrënjë valeriane	Rhizome valerianae Valeriana officinalis L.f. valerianaceae
---	--

Kërkesat cilësore

Treguesit organo-shqisore

Treguesit	Karakteristikat
Pamja	Rrënjë të zhvilluara, të thata, të pastra, të pastruara nga rrënjët e mbitokës, dherat dhe rrënjët e kalbura, rrënjët duhet të jenë të mbuluara me fibra dhe pjesërisht nga fibra të copëtuara. Me aromë të rëndë, aromë e keqe karakteristike e vetë bimës.
Ngjyra	Rrënjët nga jashtë kafe dhe benda të bardha. Nuk lejohen rrënjë të nxira, të mykura, të kalbura, dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fiziko-kimik

Treguesit	Norma %
Lagështira, jo më shumë se	12
Rrënjë me ngjyrë jo normale, jo më shumë se	5
Lëndë organike të vetë bimës, jo më shumë se	1
Lëndë minerale, jo më shumë se	2

METODAT E ANALIZAVE KIMIKE

BIME MJEKESORE, ETEROVAJORE DHE TANIFERE	Marrja e mostrës mesatare
---	------------------------------

Ky standard jep mënyrën e marrjes së mostrës mesatare në bimët mjekësore, eterovajore dhe tanifere.

Parimi i metodës.

Metoda bazohet në marrjen e një sasive materiali bimor nga pjesët e ndryshme të çdo paketimi, duke u përpunuar në mënyrën e përshkruar më poshtë, për të përfaqësuar plotësisht partinë e mallit.

Mënyra e marrjes së mostrës mesatare.

Në fillim përcaktohen paketimet që do të hapen në sasive që vijojnë: kur vijnë 1-4 paketime merren mostrat nga të gjitha paketimet, kur vijnë 6-10 paketime merren mostra nga 6 paketime dhe më tej për çdo 10 paketime merret mostër vetëm nga njëri paketim. Pra kur kontigjenti përbëhet nga një numër i madh paketimesh numri i paketimeve që do të hapen për tëu marrë mostra përcaktohet nga formula $n=5+ n-10/10$ ku n është numri i përgjithshëm i paketimeve.

Për të formuar mostrën, materiali merret nga pjesët e sipërme, të poshtëme dhe të mesit të çdo paketimi. Kur materiali është në trajtë pluhuri apo trajtë copash më të vogla se 1 cm, materiali që shërben si mostër merret me anë të një sonde farash. Për materialet e tjera bimore mostra merret me dorë. Për paketime që kanë përmasa të mëdha materiali të merret në thellësi prej 10 cm.

Të gjitha mostrat e marra bashkohen, përzihen me kujdes, për të mos rritur shkallën e coptimit të materialit bimor. Mostra fillestare e siguruar në këtë mënyrë rrafshohet mbi një sipërfaqe të sheshtë dhe ndahet në katër pjesët e barabarta. Dy pjesët e vendosura në anë të kundërta bashkohen dhe me dy pjesët e bashkuara vazhdon i njëjti proces, i cili përsëritet aq herë sa nxirret mostra mesatare prej 75-100 g, që është e mjaftueshme për të kryer të gjitha provat e nevojshme.

Me veprimin e fundit përgatiten dy mostra mesatare, njera prej të cilave dërgohet për analizë, ndërsa tjetra ruhet e mbyllur për rastet kur kërkohen analiza krahasuese.

METODAT E ANALIZAVE KIMIKE

BIME MJEKESORE, ETEROVAJORE DHE TANIFERE	Përcaktimi i lëndëve të huaja
---	----------------------------------

Ky standard jep mënyrën e përcaktimit të lëndëve të huaja dhe të materialit bimor që është në kundërshtim me ngjyrën karakteristike të materialit të bimëve mjekësore, eterovajore dhe tanifere.

Parimi i metodës.

Metoda bazohet në veçimin nga mostra mesatare të lëndëve të huaja në grupe sipas kërkesave me anë të vrojtimit me sy ose duke përdorur lente.

Aparatura Lente zmadhuese.

Mënyra e përcaktimit

Masa e mostrës që merret për përcaktimin e lëndëve të huaja varet nga lloji i materialit bimor: 500g për rrënjët, rizomat, lëvoret dhe barërat, 250 g për gjethet, lulet, farërat dhe frutat, 50 g për ato të copëtuara, 25g për ato të trajte pluhuri. Materiali bimor i peshuar, shpërndarë në një shtresë të hollë të njëtrajtëshme. Lënda e huaj përcaktohet me anë të vrojtimit me sy ose duke përdorur lente. Lëndët e huaja veçohen në grupe sipas kërkesave, peshohen me saktësi deri në 0.05 g.

Me të njejtën mënyrë përcaktohet dhe materiali bimor që është në kundërshtim me ngjyrën karakteristike të vetë bimës.

Me lëndë të huaja përveç përzjerjeve minerale (gurë, rërë, copëra dheu, pluhur që përcaktohen veç, sipas kërkesës, mund të konsiderohet edhe përzjerje bimësh të tjera, madje dhe përzjerje të pjesëve të po asaj bime, që nuk i përgjigjet emërtimit të bimës.

Mënyra e llogaritjes

Lëndët e huaja të veçuara në grupe sipas kërkesave peshohen me saktësi deri në 0.05g dhe përcaktohet përbërja në % (a) e çdo grupi lëndësh të huaja për materialin bimor të tharë në ajër sipa formulës: $a=100 \cdot p \div p$ ku pë - është masa e lëndës së huaj ose e materialit bimor që është në kundërshtim me ngjyrën karakteristike të bimës.

p - është masa e mostrës së marrë.

METODAT E ANALIZAVE KIMIKE

BIME MJEKËSORE, ETEROVAJORE DHE TANIFERE	Përcaktimi i lëndëve minerale
---	----------------------------------

Ky standart jep mënyrën e përcaktimit të lëndëve minerale në bimët mjekësore, eterovajore dhe tanifere.

Parimi i metodës

Metoda bazohet në veçimin e lëndëve minerale nga mostra mesatare me anën e vrojtimit me sy dhe të sitjes.

Aparatura dhe reagentë

Sitë mëndafshi, sita me përmasa të ndryshme vrimash.

Mënyra e përcaktimit

Masa e mostrës që merret për përcaktimin e lëndëve të huaja varet nga lloji i materialit bimor: 500g për rrënjët, rizomat, lëvoret dhe barërat, 250 g për gjethet, lulet, farërat dhe frutat, 50 g për ato të copëtuara, 25g për ato në trajtë pluhuri.

Materiali bimor i peshuar shpërndahet në shtresë të hollë uniforme dhe me anën e syrit veçohen përzjerjet minerale (gurë, rërë, copra dheu) pastaj materjali bimor sitet. Për barëra, gjethë, rrënjë e rizoma përdorën sita teli me vrima me madhësi 2-3 mm, (për farëra, fruta e lule përdorën sita metalike me vrima me madhësi 0.5-1 mm).

Pjesa që kalon nëpërmjet sitës së parë, sitet edhe njëherë me sitë mëndafshi, pjesa që kalon sitën quhet pluhur dhe konsiderohet përzjerje minerale dhe peshohet së bashku me gurët, rërën dhe coprat e dheut të veçuar më parë.

Mënyra e llogaritjes

Lëndët minerale të veçura peshohen me saktësi deri 0.05g dhe përcaktohet përbërja në % e lëndëve minerale sipas formulës:

$$a=100 \cdot p \div m$$

ku pë - masa e lëndëve minerale

p - masa e mostrës së marrë.

METODAT E ANALIZAVE KIMIKE

BIME MJEKESORE, ETEROVAJORE DHE TANIFERE	Përcaktimi i shkallës së thërmimit
---	---------------------------------------

Ky standard jep mënyrën e përcaktimit të shkallës së thërmimit të bimëve mjekësore, eterovajore dhe tanifere.

Parimi i metodës

Metoda bazohet në sitjen e materialit bimor dhe në përcaktimin me anë të peshimit të sasisë së materialit që kalon sitën.

Aparatura dhe reagentë.

Sita metalike me vrima të rrullullakta me përmasa sipas kërkesës.

Sita me fije të pëlhurta me vrima katror dhe sitë me vrima me dimatër 0.25 mm.

Mënyra e përcaktimit

Thërmimi përcaktohet me anë të sitjes. Përmaset e vrimave përcaktohen për secilen lloj bime. Për sitjen e materialit me përmasa të vogla (fruta, fara etj) përdorën sita metalike me vrima të rrumbullakta, ndërsa për material që përbëhen nga objekte të trasha (rrënjë, bimë, gjethë etj, përdorën sita me fije të pëlhurta me vrima katrore.

Në qoftë se materiali është i thërmueshëm, sitja bëhet me kujdes me lëvizje rrotulluese, duke e tundur shumë lehtë sitën në mënyrë që të mos rritet thërmimi fillestar. Për materialet që nuk thërmohen gjatë sitjes, mund të bëhet përzierje. Në qoftë se materiali i thërmuar që fitohet, sitet për së dyti, përmas një site me dimatër 0.25 mm, pjesa që kalon sitën quhet pluhur dhe konsiderohet si përzierje minerale.

Mënyra e llogaritjes

Pas peshimit, përcaktohet përqindja e masës së thërmuar me anë të formulës:

$$a = 100 \cdot p \div p$$

ku p - masa e sasisë së thërmuar që kalon sitën.

p - masa e materialit të analizuar.

METODAT E ANALIZAVE KIMIKE

BIME MJEKËSORE, ETEROVAJORE DHE TANIFERE	Përcaktimi i shkallës së dëmtimit të materialit bimor nga dëmtuesit e hambarit.
--	---

Ky standard jep mënyrën e përcaktimit të shkallës së dëmtimit nga dëmtuesit e hambarit.

Parimi i metodës

Metoda bazohet në sitjen e materialit bimor dhe në numerimin në materialin që ka kaluar sitën të insekteve me anë të vrojtimit me sy, ose duke përdorur lente.

Parimi i metodës Metoda bazohet në sitjen e materialit bimor dhe në numerimin në materialin që ka kaluar sitën e insekteve me anë të vrojtimit me sy, ose duke përdorur lente.

Aparatura Lente dhe sita me përmasa 0.5 dhe 2.5 mm.

Mënyra e përcaktimit

Në qoftë se dëmtuesi është *Alleurobis farina* Degger, përcaktimi bëhet duke situr materialin për mes një sitë 0.5mm. Në materialin që e kalon sitën numërohen insektet me ndihmën e një lente të thjeshte. Materiali bimor konsiderohet i shkallës së parë të dëmtimit në qoftë se gjenden jo më shumë se 20 insekte për çdo kg material bimor, i shkallës së dytë kur gjenden më shumë se 20 insekte që levizin lirisht dhe nuk formojnë masë kompakte, e shkallës së tretë kur ka shumë insekte që formojnë masë kompakte ose kur lëvizja e tyre është e vështirësuar. Në qoftë se dëmtuesi është *Callandria granaria* përcaktimi bëhet duke situr materialin përmes një site 2.5 mm. Në këtë rast materialin bimor konsiderohet i shkallës së parë të dëmtimit në qoftë se gjenden 1 deri në 5 insekte, të shkallës së dytë kur gjenden 6-10 insekte dhe të shkallës së tretë kur gjenden më shumë se 10 insekte.

Në qoftë se dëmtuesi është *Tinea pellionella*. F. dhe sidotiepa panacea materialin bimor nuk sitet, por dëmtuesi veçohet me dorë. Shkalla e dëmtimit përcaktohet duke u nisur nga numri i dëmtuesve për çdo kg material bimor. Normat janë të njëjta me ato të përcaktuara për *callandria granaria*. L.

METODAT E ANALIZAVE KIMIKE

BIME MJEKESORE, ETEROVAJORE DHE TANIFERE	Përcaktimi i hirit të përgjithshëm.
---	--

Ky standard jep mënyrën e përcaktimit të hirit të përgjithshëm në bimët mjekësore, eterovajore dhe tanifere.

Parimi i metodës

Metoda bazohet në djegjen e mostrës deri sa në të të mos mbeten shenja karboni. Për të penguar formimin e karbonit të forms së grafitit, që oksidohet me vështirësi dhe për të shmangur avullimin ose dekompozimin e klorureve dhe karbonateve, nxehja e mostrës të fillojë ngadalë, ndërsa djegja të përfundojë në temperaturë sa më të ulët (të mos kalojë 450⁰ C.)

Aparatura dhe reagentë

Mufel ose lllampe gazi, kroxhol porcelain, tretësirë e ngopur nitrati amoni.

Mënyra e përcaktimit

Për përcaktimin e hirit të përgjithshëm këshillohet të merren mostra nga 2-4 gr. Në qoftë se mostrat janë mjaft homogjene ose kanë përmbajtje të mëdha hiri (psh. 10% ose më tepër) mjaftojnë 2 gr, për mostra më pak homogjene ose përmbajtje të pakët hiri (psj. 5% ose më pak) janë të nevojshme 4g për mostrat mesatare.

Materiali i grirë në masën e lartpërmendur vendoset në një kroxhol porcelain të përshtatshëm, që është kalcinuar dhe peshuar paraprakisht. Materiali bimor përhapet në kroxhol në shtresë të rrafshët dhe peshohet me kujdes. Pastaj përmbajtja e kroxholit digjet duke e rritur gradualisht nxehësinë, por duke mos i kaluar 450⁰C, derisa të mos përmbajë më karbon, ftohet në një eksikator dhe peshohet. Në qoftë se nuk digjet i tërë karboni i mostrës, krexholi ftohet dhe mbetja njomet me rreth 2ml ujë ose më mirë me tretësirë të ngopur nitrati amoni. Thahet më parë në banjo uji, me pas në furnellë dhe se fundi kalçinohet deri në masë të pandryshueshme.

Mënyra e llogaritjes

Përmbajtja në % e hirit të përgjithshëm, llogaritet sipas formulës:

$$a=100 \cdot p \div p$$

ku pë - masa në gram e hirit që gjendet në kroxhol.

p - masa në gram e mostrës që analizohet.

METODAT E ANALIZAVE KIMIKE

BIME MJEKESORE, ETEROVAJORE DHE TANIFERE	Përcaktimi i hirit sulfat.
---	-------------------------------

Ky standard jep mënyrën e përcaktimit të hirit të sulfatit në bimët mjeksore, eterovajore e tanifere.

Parimi i metodës

Metoda bazohet në trajtimin e materialit bimor në acid sulfurik dhe djegjen e tij në temperaturë 800°C.

Aparatura dhe reagentë

Mufel ose llampe gazi, kroxhol porcelain, acid sulfurik i përqendruar, karbon amoni.

Mënyra e përcaktimit

Në një kroxhol porcelain të kalcinuar e të peshuar paraprakisht vendosen 1-3 g material i grirë. Sasia e materialit që nxirret përcaktohet si në rastin e përcaktimit të hitit të përgjithshëm. Shtohen në kroxhol rreth 2ml acid sulfurik (me dendësi afërsisht 1760g/l). kroxholi nxehet fillimisht mbi furnelë derisa mostra të karbonizohet dhe pastaj kalçinohet me kujdes derisa mostra të karbonizohet dhe pastaj kalçinohet me kujdes deri në 800°C, derisa të mos ketë më karbon.

Më pas kroxholi ftohet dhe i shtohen disa pika acid sulfurik për të njomur hirin e përftuar. Kroxholi pas shtimit të acidit nxehet në fillim me anë të një furnele dhe më pas kalçinohet njësoj si herën e parë. Së fundi, pas ftohjes, në kroxhol shtohet pak karbonat amoni (kristale) dhe kalçinohet deri në masë të pandryshueshme.

Mënyra e llogaritjes

Përbajtja në % e hirit sulfat, llogaritet sipas formulës:

$$a=100 \cdot p \div p$$

ku pë - masa në gram e hirit që gjendet në kroxhol.

p - masa në gram e mostrës që analizohet.

METODAT E ANALIZAVE KIMIKE

BIME MJEKESORE, ETEROVAJORE DHE TANIFERE	Përcaktimi i hirit të patretshëm në acid.
---	--

Ky standard jep mënyrën e përcaktimit të hirit të patretshëm në acid në bimët mjekësore, eterovajore e tanifere.

Parimi i metodës

Metoda bazohet në trajtimin e hirit të përgjithshëm ose të hirit sulfat me acid klorhidrik të holluar, filtrimin e mbetjes, shplarje e filtrit me ujë të nxehtë dhe djegjen e materialit që mbetet mbi filtër së bashku me vetë filtrin.

Aparatura dhe reagentë

Mufel ose llampë gazi, acid klorhidrik (afërsisht 2N) kroxhol porcelani, letër filtri që sëka mbetje hiri, xham sahati.

Mënyra e përcaktimit

Në kroxholin që përmban hirin e përgjithshëm ose hirin sulfat shtohen 25 ml acid klorhidrik (që përmban afërsisht 70g/l pra afërsisht 2 N), mbulohet me xham sahati dhe vlohet lehtë për 5 minuta. Shplahet xhami i sahatit me 5 ml ujë të nxehtë duke i kaluar ujrë e shplarjes në kroxhol. Përmbajtja e kroxholit mblidhet mbi një letër filtri që nuk le hi dhe shplahet me ujë të nxehtë derisa filtrati të mos tregojë reaksion acid. Pas shplarjes letra e filtrit që përmban lëndët e patretura në acid, kalohet në kroxholin që kemi përdorur, thahet mbi një furnelë dhe kalçinohet deri në masë të pandryshueshme.

Mënyra e llogaritjes

Përmbajtja në % e hirit të patretshëm në acid, llogaritet sipas formulës:

$$a=100 \cdot p\bar{e}/p$$

ku p \bar{e} - masa në gram e hirit që gjendet në kroxhol.

p - masa në gram e mostrës që analizohet.

METODAT E ANALIZAVE KIMIKE

BIME MJEKËSORE, ETEROVAJORE DHE TANIFERE	Përcaktimi i mbetjes së thatë.
---	-----------------------------------

Ky standard jep mënyrën e përcaktimit të mbetjes së thatë në bimët mjekësore, eterovajore e tanifere (që njëkohësisht jep mënyrën indirekte të përcaktimit të lagështirës).

Parimi i metodës Metoda bazohet në tharjen e materialit bimor në temperaturë 100-105°C, në thermostat ose në tharjen në temperaturën e dhomës në eksikator, me anhidrid fosforik anhidër. Tharja vazhdohet derisa masa e materialit në dy peshime të njëpasnjëshme me një interval kohe prej 30 min të mos ndryshojë më shumë se 5 mg.

Aparatura dhe reagent Thermostat, eksikator, anhidrid fosforik anhidër.

Mënyra e përcaktimit Në një pezafilter vendosim 2-10g material bimor, sipas rastit, që është peshuar me kujdes në një pezafilter të thatë. Materiali bimor tëi ketë coprat jo me të medha se 3 mm, të prera ose të copëtua. Farërat ose frutat të copëtohen, ndërsa ato që janë më të vogla se sa 3 mm të krisen (çahen). Tharja e mostrës të bëhet në pezafilter dhe jo në pjata petri apo xham sahati, sepse pas tharjes kapaku i pezafiltrit pengon rithithjen e lagështirës së mjedisit rrethues nga ana e materialit bimor. Mostra thahet sipas njerës nga tre mënyrat e treguara më poshtë. Derisa dy peshime të njëpasnjëshme çdo 30 minuta të mos japin ndryshime në masë më shumë se 5 mg. Peshimi i parë bëhet jo përpara se të jenë mbushur 4 orë tharje. Mostra thahet në njerën nga këto tre mënyra:

- Tharje në thermostat në 100-105°C për rreth 5 orë para peshimit të parë.
- Tharje në eksikator mbi anhidrid fosforik në presion atmosferik dhe temperaturën e dhomës.
- Tharje në eksikator mbi anhidrid fosforik në vakum dhe temperaturën e dhomës.

Mënyra e llogaritjes Llogaritja e mbetjes së thatë bëhet sipas formulës:

$$a=100 \cdot p \div p$$

ku p - masa e mostrës pas tharjes.

p - masa e mostrës pas tharjes (e materialit të thatë në ajër).

Në qoftë se kërkohet përqindja e lagështirës (së bashku me lëndë volatile) që përmban materiali, llogaritja bëhet sipas formulës: $a=100 \cdot (p-p) \div p$ ku: p dhe p shprehin të njëjtat specifitime si më lart.)

METODAT E ANALIZAVE KIMIKE

BIME MJEKESORE, ETEROVAJORE DHE TANIFERE	Përcaktimi i lagështirës.
---	------------------------------

Ky standard jep mënyrën e përcaktimit të lagështirës në bimët mjekësore, eterovajore e tanifere.

Parimi i metodës

Përcaktimi i lagështirës në bimët mjekësore, eterovajore dhe tanifere bëhet me anë të metodës azeotropike, e cila bazohet në vlimin e materialit bimor me një tretës që nuk përzihet me ujin zakonisht toluenë. Gjatë vlimit uji i pranishëm në material merret nga tretësi, distilohet së bashku dhe pas kondensimit uji veçohet duke rënë në fund.

Aparatura dhe reagentë

Për përcaktimin e lagështirës nevojitet një aparat qelqi Din- strak dhe 200ml toluenë (ose ksilen) si tretës për çdo përcaktim. Toulenti përdoret përsëri në përcaktimet e tjera.

Mënyra e përcaktimit

Në ballonin e tharë të aparatit futen 200 ml, toluen dhe rreth 2 ml ujë. Përmbajtja e ballonit distilohet për rreth 2 orë, lihet të ftohet për 30 minuta dhe lexohet në tubin e graduar vëllimi i ujit të mbledhur (me saktësi prej 0.05 ml). Pas kësaj në ballon vendoset një sasi e tillë mostre që të përmbajë rreth 2-3 ml ujë (mostra peshohet me saktësi deri në të qintat e gramit). Nxehja e ballonit të aparatit bëhet në mënyrë të tillë që nga refregjeranti të bien rreth 2 pika në sekondë, derisa të largohet shumica e ujit që parashikohet, ndërsa më vonë rritet ritmi i distilimit deri rreth 4 pika në sekondë.

Pasi të përfundojë distilimi i tërë ujit, shplahen faqet e brendëshme të refrigjerantit me toluen dhe distilohet edhe për 5 minuta. Pastaj burimi i nxehtësise, pritet që aparati të ftohet deri në temperaturën e dhomës dhe lexohet vëllimi i ujit të grumbulluar.

Mënyra e llogaritjes

Llogaritja e lagështirës bëhet sipas formulës: $a=100*(n\ddot{-}n)/p$
ku n - numri i mililitrave të ujit të përdorur në distilimin e parë (pa praninë e materialit)

p - masa e materialit që analizohet në gram

në - numri i përgjithshëm i mililitrave të ujit përfundimtar të

grumbulluar në tubin e graduar.

Ruajtja dhe transportimi

Artikujt bimorë të ruhen në magazinë të pastra, të ajrosura pa lagështirë, me hapësirën dhe ndriçimin e nevojshëm, të moslejohen rënia direkt e rrezeve të diellit mbi to. Artikujt bimor vendosen mbi dysHEME të shtruar me dërrasë. Kur dysHEMEJA është prej çimentoje vendosen kavaleta dërrase me këmbëza 10-15 cm të larta dhe mbi to vendosen bimët ose ballot, thasët ose kutitë e kartonit me bimë. Ballot, thasët e kutitë e kartonit me bimë vendosen 50 cm larg mureve të magazinës.

Ballot, thasët sivosen nga 4-7 copë njëri mbi tjetrin, kurse kutitë e kartonit vendosen sipas llojit të bimës, vëllimit dhe masës së tyre. Në magazinë të këtë rrugë kalimi për të kontrolluar gjendjen e bimëve dhe për të bërë manipulimet e nevojshme. Në çdo 3-4 rradhë me thasë, ballo ose kuti kartoni të lihet rrugëkalimi.

Transportimi i artikujve bimor bëhet me çdo lloj mjete të pastër dhe të mbulura kur koha është me shi. Bimët helmuese të forta ruhen, manipulohen dhe ambalazhohen në dhoma veç nga bimët e tjera jo helmuese.

Për të gjithë ata që eksportojnë në ShBA ERËZA TË PASTRA -PËRCAKTIMET E ASTA-s MBI PASTËRTINË QË KANË HYRË NË FUQI MË 28 PRILL 1999

Specifikimet e ASTA-s për pastërtinë

Sipas standardeve, lëndë e huaj përkufizohet çdo material i huaj që gjendet në produkt dhe kjo përfshin, por nuk kufizohet vetëm në: pluhur, fije, kërcenj, shkopinj, fara të huaja jo helmuese, jashtëqitje, lëndë organike dhe ndotës me origjinë shtazore. Niveli i lejuar i përmajtjes së ndotësve, sipas standardeve duhet të jetë nën ato vlera që janë paraqitur në tabelën e mëposhtëme me përjashtim të kolonës Δ "Insekt i plotë, i ngordhur", sasia e të cilave nuk

duhet të rejkalojë në mënyrë kategorike, kufijtë e paraqitura në tabelë.

Emri i Erëzave, apo herbave farave	Δ Insekt i plotë i ngordhur	Jashtëqitje gjitarësh	Jashtëqitje të tjera	Myqe	Dëmtime/ Infektive nga insektet	Lëndë të huaja
	Në numër	Në mg/0.5 kg	Në Mg/0.5kg	% sipas peshës	% sipas peshës	% sipas peshës
Anisi	4	3	5	1	1	1
Borzilok i ëmbël	2	1	2	1	1	0.5§
Kardamon/cynara	4	3	1	1	1	0.5
Sena	2	1	1	5	2.5	0.5
Spec Djegës Kilian	4	1	8	3	2.5	0.5
Karafli*	4	5	8	1	1	1
Koriandër	4	3	10	1	1	0.5
Farë Kumeli/ bar gjumi	4	3	5	1	1	0.5
Fara kopre	4	3	2	1	1	0.5
Fara Maraje/ finoku	SF(2)	SF(2)	SF(2)	1	1	0.5

Gjethe dafine**	2	1	10	2	2.5	0.5
Manxurana	3	1	10	1	1	1\$
Rigon***	3	1	10	1	1	1\$
Fara lulëkuqe	2	3	3	1	1	0.5
Gjethe rozmarine	2	1	4	1	1	0.5\$
Sherebelë**	2	1	4	1	1	0.5
Trumza	2	1	10	1	1	0.5\$
Tarragon/Pelin	2	1	1	1	1	0.5\$

Standardet e pastërtisë-shpjegime

** Gjethe dafine & Sherebelë

“kërcejtë”, për arsye ekonomik, konsiderohen ndryshe; nuk ndiqet kriteri: ka apo nuk ka kërcenj (po pati kërcenj) duhet pastruar, po nuk pati kërcenj nuk duhet pastruar).

*** Rigoni Analizat për përmbajtje Cëmërdelli (Cotinus coggyria scop) nuk janë të detyrueshme nëse në mostra shënohet “Produkt Meksikan”.

* Insekte të ngordhura_Nuk duhen kaluar kategorikisht kufijtë e treguara në tabelën e mësipërme.

* Material i huaj Përfshin pjesë të tjera bimësh si p.sh gjethe të bimëve të tjera.

Udhëzime për nivelet maksimale të lagështisë në erëza Qershor 1991

Borzilok	12%
Gjethe dafine	9%
Kardamoni	12%
Fara Koriandri	9%
Farë bar gjumi (Kumeli)	9%
Fara finoku	10%
Rigon	10%
Fara lulëkuqeje	9%
Rozmarinë	10%
Sherebelë	10%
Tarragon (pelin)	10%
Timus	10%

AMBALLAZHIMI

I BIMËVE MJEKESORE, ETEROVAJORE DHE TANIFERE
Në ballo me masë neto 50 kg me përmasa 55x60x70 ±2 cm prej
pambuku, beze, ose polyester për bimët e paprocesuara dhe dhe
voluminoze

Lule akacie	Fletë qershigle
Lule blini argentea	Fletë rrush ariu
Lule kokeli me bisht	Fletë sherebele
Lule çikore	Fletë tatulli
Lule gjineshtre (lule xane)	Fletë ulliri
Lule murrizi me fletë	Fletë fiery mashkull
Lule mëllage	Bar arsi
Lule shtogu veshtull	Bar blete
Lule tërfil i bardhë	Bar çaj mali
Fletë angjinare	Lule aguliçe
Fletë blini	Lule blini
Fletë dëllinjë e zezë	Lule kokëli pa bisht (petalet)
Fletë manaferre	Lule zogu
Fletë ferre zvarranike	Lule manushaqe
Fletë gështenje	Lule mijëfletëshe
Fletë dielli e ngushtë	Lule tërfil i kuq
Fletë hithri	Fletë arrë
Fletë landro	Fletë barblete
Fletë luleshtudhe	Fletë ekualipti
Fletë manushaqe	Fletë mjedre
Fletë mersine	Fletë frashëri i bardhë
Fletë mëllage e bardhë	Fletë dielli e gjerë
Fletë murrizi	Fletë helmarine
Fletë netulle	Fletë lajthie

Flet lotzoje	Bar tamlagjaku
Fletë luletogezi leshtor	Bar fik uku
Fletë mareje	Bar hithri
Fletë mështekne	Bar kamomili
Fletë mëllage	Bar kin fushe
Fletë mushkrije	Bar lulebasani
Fletë hardhie	Bar mendër gjethegjatë
Fletë qumështore	Bar njëgjire
Fletë shelgu e bardhë	Bar pelini i zi
Fletë shtogu	Bar qumështore
Fletë thundër mushke	Bar rigon i bardhë
Fletë vjeshtull	Bar trumze
Bar pate	Bar vjeshtulle
Bar bisht kali	Bar qerbashi
Bar shtrapere	Maja të lulëzuara të bargjakut
Bar çikore	Bar majdanoz i egër
Bar hermarine	Bar majasëlli
Bar jonxhe e egër	Lëvore fasule të bardha
Bar kalaminti	Rrënjë e kuqe
Bar krizantene	Rrënjë grami pa fijeza
Bar mendër e egër	Rrënjë hithri
Bar mijëfletësh	Rrënjë qumështore
Bar pelini i bardhë	Rrënjë shperndre
Bar pondiqe e egër	Rrënjë rrushkulli
Bar rigon i kuq	Rrënjë skopolie
Bar sporisi mjeksor	Bishta qershie dhe vishnje
Bar veronike	Myshk pishë
Bar zhumbrice	Myshk shkoze

Qepë deti e thatë	Buqetë sherebeli
Fletë dafine	
Bar trumze e kopshtit	Në thasë pambuku ose
Petale luledielli	polyestër me masë neto 25 kg
Bar psoralea	si dhe në thasë prej letre 10-
Bar papinollës, kundër	20 kg sipas peshës specifike të
verdhëzes	bimës.
Buqeta sherebele	Lule kulumbrie
Rrenej aguliçe	Lule portokalli
Rrënjë çikore	Trumzë e shkoqur
Rrënjë grami me fijeza	Rigon i kuq i shkoqur
Rrënjë mëllage e bardhë e	Zhumbricë e shkoqur
qëruar	Frut konopice
Rrënjë qumështore me fletë	Kokër limoni aguridh
Rrenej rodhe e madhe	Kokër mersine
Rrënjë valeriane	Kokër murrizi
Myshk dushku	Kokër qershgle e egër
Myshk ahu	Kokër vordhëze e egër
Mustaqe misri	Kallinj të frutifikuar të gjethe
Lule piretrumi	diellit të gjerë
Bar shëngjini	Kokërr gështenje e egër
Petale të lulëkuqes	Farë sinap i bardhë
	Farë sinap i kuq
Në ballo ose thasë, beze ose	Lëvore kokërr arrë
polyestër: 50 kg për ballo dhe	Lëvore shegë e egër
25 kg për thasë	Lule lavandul e thatë
Shqeme dhe Cermedell	Lëndë lisi
Tufa mersine	Bar timus i shkoqur

Bar hyssopis i shkoqur	Lëvore dushku
Lëvore kokërr gështenje e egër	Lëvore shtogu
Lëvore portokalli	Rrënjë fik ujku
Lëvore vishi	Rrënjë gjuhë nuse
Lëvore farës gjështenjës së egër	Rrënjë stërkungulli
Rrënjë genti	Rrënjë shkumbake
Rrënjë helmarine	Rrënjë shpatore e pa qëruar
Lue murrizi pa fletë	Bri thekri
Lule shtogu	Sythe plepi i zi
Bar mendër e egër e shkoqur	Tubere (zhardhok) salepi
Rigon i bardhë i shkoqur	Bar borzilok i thatë
Frut kërkute	Manxurane e shkoqur
Kokër kulumbrie	Shëngjin i shkoqur
Kokër portokalli aguridh	Trumzë kopshti e shkoqur
Mollë të egra të grira të thara	Frut koriandri
Kokër nerënxe agurish	Lule netull
Kokërr shtogu	Gëzhjojë valanidhi
Frut drize	Rrënjë shpatore e qëruar
Farë kungulli	Rrënjë shtarrë
Farë sinap i zi	Sythe pishë
Farë xhirokulli (në thasë stof dopio)	Guacka bajamesh
Farë kumeli	Fletë rozmarine
Gogla dushku	Borzilok i shkoqur
Lule shëngjin i thatë i shkoqur	Bar mendër i butë
Lëvore arrçi (drunakuq)	Bar manxurane
Lëvore nerënxe	Frut glikanxo
	Frut anasoni

Në thasë prej pëlhure, zhuke ose gjineshtre me masë neto 25 kg.

Kokër dëllinjë e kuqe
 Kokër trendafil i egër pa Farë
 Kokër dëllinjë deti
 Kokër dëllinjë e zezë
 Kokër dëllinjë e zezë 7 mm
 Rrënjë fieri mashkull

Gjithë një transporti në dhoma frigoriferike dhe në arka ambalazhi plastike ose druri si dhe fuçi druri me tretësirë SO₂

Kokër trëndafil i egër i njomë
 Kokër luleshrudhe e njomë
 Kokër manafere e njomë
 Frut qershigle i njomë

Në kuti kartoni ose në thasë prej letre

Fletë portokalli e njomë
 Fletë zhuke të thata (të lidhura në tufa)
 Lastar xane
 Bar borzilok i njomë
 Bar manxurane i njomë

Bar mendër e butë i njomë
 Bar shëngjin i njomë
 Bar trumzë kopshti e njomë
 Bar lavandul e njomë
 Lule shëngjin i njomë
 Bar timus i njomë
 Bar hisopus i njomë

Në kuti kartoni të valëzuara 5 fijesh me masë neto 10 kg me dimensione 56x46.5x25.5 cm

Lule gështënje e egër
 Lule kamomili
 Pluhur lule kamomili
 Lule shqerrë
 Lule thundër mushke

Të gjitha këto përkujdesje dhe normative nuk do të kishin kuptim në se nuk do të mbahen parasysh ashtu siç paralajmërojnë dhe shoqatat tona si motra, ajo Amerikane apo Evropiane për të patur parasysh dhe në qendër të vëmendjes.

PESTICIDET

Pesticidet që lejohen të përdoren në SHB në Erëza, Fara, Herba

Bashkëlidhur është një listë me pesticide të cilat lejohen nga Agjensia Amerikane e Mbrojtjes së Mjedisit për t'u përdorur. Kjo listë rishikohet periodikisht për të reflektuar ndryshimet e bëra nga AMM (EPA). Këto janë paraqitur në pjesën 40 e Kodit të Standardeve Federale botuar më 1 Korrik 1999. Seksioni 180 bën fjalë për toleranca në përdorimin e pesticideve, sipas bimëve, në lëndë të para bujqësore, ndërsa seksioni 185 bën fjalë për toleranca në përdorimin e shtesave në ushqime të përpunuara njerëzish apo kafshësh.

Standardet mbi përmbajtjen e mbetjeve të pesticideve në ushqime njerëzish dhe kafshësh përcaktohen në Seksionin 402 të këtij ligji i referohen ushqimit të njerëzve /kafshëve që prodhohen në vend apo importohen por që provohen se përmbajnë mbetje pesticidesh. Për këtë arsye, jashtë Amerikës, nuk i nënshtrohen kërkesave të Agjensisë Amerikane të Mbrojtjes së Mjedisit – AMM (EPA), kërkesa që përcaktohen në Aktin Federal mbi përdorimin e Insekicideve, përsëri sasia e mbetjes së pesticideve në ushqime njerëzish apo kafshësh, që hyjnë në Amerikë, duhet të jetë në nivelin e tolerancave apo kufijve të përcaktuara nga AMM (EPA). Në rastin kur mbetjet e pesticideve janë të paevitueshme, atëherë AUI (FDA) përcakton një nivel kritik. Më poshtë përshkruhen standardet e përdorimit të gjithë tipeve të pesticideve. Përkufizimet e sakta jepen në Kodin e Standardeve Federale.

Toleranca në përdorimin e pesticideve

Tolerancat mbi sasinë maksimale të pesticideve në ose mbi lëndë të para bujqësore janë përcaktuar nga AMN (EPA) në Seksionin 408 të Ligjit Federal mbi Artikujt Kozmetikë dhe Farmaceutikë. Sipas po të njëjtit Seksion, AMM autorizohet gjithashtu, që të mos lejohet toleranca për mbetje pesticidesh në lëndë të para bujqësore. Tolerancat apo mostolerancat marrin rëndësi të jashtëzakonshme atëherë kur AMM jep leje për regjistrimin e një pesticidi të caktuar, sipas rregullave të Ligjit Federal mbi Artikujt Kozmetikë dhe Farmaceutikë, pesticid i cili do të përdoret në SHBA në ushqime njerëzish apo kafshësh.

Toleranca për pesticidet në aditivët ushqimorë

Tolerancat dhe mostolerancat mbi përdorimin e aditivëve ushqimorë përcaktohen në Seksionin 409 të LFAKE. Ky ligj bën fjalë për nivelet e mbetjeve të pesticideve që akumulohen në lëndët e para bujqësore që më

pas përdoren për prodhim, por në asnjë mëyrë këto mbetje nuk duhet të kalojnë nivelet e lejuara. ASTA inkurajon tërë ata që furnizojnë industrinë e erëzave për tu përfshir në luftën e integruar kundër sëmundjeve dhe dëmtuesve. Megjithatë, edhe nëse lind nevoja e përdorimit të pesticideve, këto të fundit duhen përdorur aty ku dhe siç duhet pa dëmtuar shëndetin e njeriut apo cilësinë e produktit. Pesticidet duhen përdorur në përputhje me standardet e vendit ku përdoren dhe standardet e vendit ku do të tregëtohen këto produkte.

Në të njëjtën kohë, ne dimë që përdorimi i pesticideve është nën shqyrtim të hollësishëm nga shkencëtarët dhe specialistët përkatës. Prandaj ne inkurajojmë furnizuesit që përdorin pesticide që të marrin parasysh opinionin e specialistëve dhe shkencëtarëve, opinionin i cili ndryshon vazhdimisht. Duam tëju kujtojmë gjithashtu që standardet dhe rregullat e paraqitura në këtë material edhe mund të ndryshojnë.

SPECIFIKIMET E ASTA-s PËR PESTICIDET

Cituar në Pjesa 40 e KSE, seksioni 180	Pesticidi	A lejohet të përdoret	Toleranca në ppm	Shpjegime
§180.108	Asefat	Po	4	Piperët (të cilët nuk duhet të kenë më shumë se 1 ppm O, S- di metil fosforamidotiat)
§180.1002	Alletrin	Po	Sëka	Piperet (bardhë, i zi)
§180.225	Fosfid alumini	Po Po	0.01 0.1	(A) fumigant paravyeljes kundër vatrave të dëmtuesve në farat e suzamat.
§180.1121	Acid Borik e kripëra të tij	Po	Sëka	(A)
§180.103	Kaptan	Po	25	Piper (i bardhë, i zi)
§180.169	Karbaril	Po	10	Piperet (i bardhë, i zi), kopra e freskët.
§180.254	Karbofuran	Po	0.02	Piperet (të cilët nuk duhet të kenë më shumë se 0.2 ppm karbamat)
§180.342	Klorpirifos	Po	1	Piperet (i bardhë, i zi)
§180.1001.1	Preparate me baë Bakri	Po	Ska	(A)
§180.414	Kiromazinë	Po	1	Piperet (i bardhë, i zi)
§180.235	2.2-DDVP	Po Po	0.5 2	(A) panvarësisht nga përmbajtja e yndyrave (A) mbi 6% yndyra

§180.204	Dimetoat	Po	2	Piperet (i bardhë, i zi)
§180.221	Difonat	Po	0.1	Mentha piperita, mentha spicata
§180.182	Endosulfan	Po	2	Piperet F.
		Po	0.2	Mustard
§180.151	Oksid etileni	Po	50	Në të gjitha erëzat
§180.130	C i a n i d e Hidrogjeni	Po	250	(C)
		Po	25	Suzam
§180.375	Fosid Magnezi	Po	0.01	Piperet (i bardhë, i zi) pas vjeljes.
		Po	0.01	(A) para vjeljes
§180.111	Malation	Po	8	Piperet (i bardhë, i zi)
§180.120	Metoksiklor	Po	14	Piperet (i bardhë, i zi)
§180.123	Metil bromid	Po	100	Në bar gjumi pas vjeljes. Në rrenjë e
		Po	100	xhëndërfillës para dhe pas vjeljes. piperet
		Po	30	(i bardhë, i zi) pas vjeljes.
§180.215	Naled	Po	0.5	Piperet (i bardhë, i zi) (A), përdoret dhe
		Po	0.5	kundër insekteve (miza, mushkonja)
§180.328	Naproamid	Po	0.1	Borzilok, manxura, menta, piperet, rozmarina dhe trumëza (verore dhe dimrore)
§180.456	Oksadiksil	Po	0.1	Piperet, xinxërfilla dhe Kurkuma
§180.121	Paration	Po	1	Piperet (i bardhë, i zi)

§180.222	Prometrin	Po	0.3	Kopra- tolerancë rajonale
		Po	0.1	Majdanoz- tolerancë rajonale
§180.2	Sqfur	Po	Sigurtë	(A), ndiqni udhëzimet e etiketës 7
§185.200	Fosfid Alumini	Po	0.01	(A) kur përdoret si fumigant
§185.650	D i o k s i d karboni	Po	Sëka	(A)
§185.1900	2.2 – DDVP	Po	0.5	(A) kur përdoret në paketën apo kuti me ushqime të paskadueshme
§185.2850	Oksid etileni	Po	50	(B)
§185.3800	Fosfid magnezi	Po	0.01	(A) fumigant për pas vjeljes
§185.3700	Metil bromid	Po	400	(A)
§185.4400	Klorpirifos	Po	1	Piperet (i bardhë, i zi)
§185.5150	Preparate me bazë bakri	Po	Sëka	(A)
§185.5200	2.2 ddvp	Po	0.5	(A)pamvarësisht nga përmbajtja e yndyrave
		Po	2	(A) mbi 60% yndyrë.
§185.4400	Azot	Po	Sëka	(A)
§185.4900	B u t o k s i d pipetonili	Po	10	(D) ruajtje pas vjeljes- lexo standardet
§185.5150	Oksid propileni	Po	300	(B) erezat të përpunuara
§185.5200	Piretrinë	Po	1	(D) ruajtje pas vjeljes- lexo standardet

Shënime:

A. Përfaqëson - Lëndë të Para Bujqësore.

B. Përfaqëson - Bimët Aromatike Mjekësore që ndahen në dy grupe si më poshtë:
Grupi i bimëve 19A - angelica; balsam; borziloku; shaja; lulekomishti; kamomili; nepeta cataria; antrisku (tharë); allium schonoprasum; allium schonoprasum kineze; clary; koriandri; (gjethet); crysanthemum balsamita; culantro (gjethet); murraya paniculata (gjethet); gjethe kpër; marubi; hisopi; lavandula; cymbopogosp; levisticum officinale (gjehe); kumak, manxura, pusqark; majdanozi; majdanozi; pennyroyal; rozmarina; syzë; shereblea; trumza; dafinë e ëmbël; karajpeli; pelin; timusi; gamtheria procumbens; galium adoratatum dhe artemisa absinthium.

Grupi i bimeve 19B – pimenta; anisi; anise star; bixa orellana; caparis spinosa; karaboti; karaboti i zi; kardamoni; sena; culantro; bar gjumi; dill; kopra e zakonshme; finoku; trigonella foenum- graecum; agrana paradisi; dëllinjë; levisticum officinale; myristica fragrans; mustard; myristica fragrans; piper i bardhë dhe i zi; lulëkuqja; shafrani dhe vanilja.

C. Përfaqëson – erëzat dhe Barnat të përkufizuara si pimenta, anisa, borziloku, dafina, piperi i zi, karaboti, sena, farat e selinosë, specat djegës kilian; kanella, karafili, koriandri, bar gjumi, kopra, xhënxërfilla; myristica fragrans, manxuraja, myristica fragrans (fara), rigoni, specat, lulëkuqja, piper i kuq; rozmarina; sherebela; trumza, trumza, timusi, kukuma dhe piperi i bardhë.

D. Përfaqëson – ushqime të thata.

Lëndët e huaja

Në përpjekje për të patur uniformitet midis standardeve të laboratorëve të aprovuar (miratuar) nga ASTA dhe të gjithë kësaj industrie, komiteti i Standardeve ka formuluar përkufizimet e mëposhtëme mbi lëndët e huaja, përkufizime të cilat paraqiten në Metodat Zyrtare analitike të Shoqatës Amerikane të Tregëtimit të Erëzave (ASTA), botimi 4.

Përkufizime të materialeve bimore të huaja/kërcejve

Sherebela: – nëse materiali bimor palcor, në çdo pikë të trupit të tij ku ka bashkime, ka diametër më të madh se 1 mm, i hiqen gjethet dhe nëse gjatësia e kalon 12.5 mm, atëherë ky material do të quhet kërcell. Për më tepër, nëse materiali bimor palcor, ka diametër më të madh se 2 mm, në çdo pikë të tij atëherë kjo pjesë quhet kërcell pamvarësisht nga gjatësia e tij. Këto pjesë të quajtura kërcell peshohen dhe pesha totale e tyre përllogaritet më pas në %.

Gjethë dafine: - nëse materiali bimor palcor, përjashtoj sythat, ka diametër më të madh se 1 mm në çdo pikë të trupit ku ka bashkime, atëherë i hiqen gjethet dhe nëse gjatësia e tij tashmë i kalon 12.5 mm, atëherë ky material do të quhet kërcell panvarësisht nga gjatësia e tij. Ky material peshohet dhe pesha totale e kërcejve shprehet në %.

Rozmarina dhe trumëza: - analizuesi përcakton një madhësi mesatare gjethesh për një kontigjent të caktuar. Çdo material bimor palcor, përjashtoj këtu gjethet, i cili e kalon madhësinë/dimensionet e përcaktuara, konsiderohet si material i huaj.

Timus: - nëse materiali bimor palcor e kalon gjatësinë 12.5 mm, atëherë ai konsiderohet si lëndë e huaj.

Rigoni: - Nëse materiali bimor palcor ka dimensione më të mëdha

se 1 mm në çdo pikë të tij ku ka bashkime, atëherë gjethet e bashkangjitura hiqen dhe nëse madhësia i kalon 12.5 mm, atëherë pjesa e mbetur konsiderohet lëndë e huaj. Për më tepër, çfarëdo lloj materiali bimor palcor që ka diametër më të madh se 2 mm në çdo pikë të tij konsiderohet lëndë e huaj pavarësisht nga gjatësia e tij.

Borzilok i ëmbël: - në çdo material palcor bimor ka diametër më të madh se 1 mm në çdo pikë të trupit të tij ku ka bashkime, gjethet e bashkëlidhura hiqen dhe nëse gjatësia është përsëri më e madhe se 12.5 mm pjesa e mbetur konsiderohet lëndë e huaj. Për më tepër, nëse materiali bimor palcor ka dimaetër mbi 2 mm në çdo pikë të tij, ky material automatikisht konsiderohet material i huaj panvarësisht nga gjatësia e tij.